



2. Sang et coagulation

- 2.1. Antithrombotiques
- 2.2. Antihémorragiques
- 2.3. Médicaments de l'hématopoïèse

2.1. Antithrombotiques

Ce chapitre reprend successivement:

- les antiagrégants
- les anticoagulants
- les thrombolytiques.

Positionnement

- Les antithrombotiques sont utilisés dans le traitement et la prévention primaire et/ou secondaire de diverses pathologies cardio-vasculaires. Les antiagrégants interfèrent avec l'agrégation plaquettaire. Les anticoagulants agissent à différents niveaux de la cascade de la coagulation.

Effets indésirables

- **Risque d'hémorragie avec tous les médicaments antithrombotiques.**

Précautions particulières

- **La prudence s'impose en cas d'insuffisance rénale et de faible poids corporel en raison d'un risque accru d'hémorragie.**
- Interruption préopératoire des antithrombotiques [voir *Folia de juin 2011 et Folia d'avril 2016*].
 - La décision d'interrompre la prise d'antithrombotiques lors d'une intervention, ainsi que la durée de cette interruption, dépendent de plusieurs facteurs:
 - Le patient et son profil de risque cardio-vasculaire: en cas d'interruption, y a-t-il un risque important de complications thromboemboliques?
 - Le type d'intervention:
 - Interventions à risque hémorragique élevé, telles que p.ex. amygdalectomie, prostatectomie transurétrale, neurochirurgie ou chirurgie au niveau du segment postérieur de l'œil
 - Interventions à faible risque hémorragique, telles que p.ex. chirurgie de la cataracte, intervention vasculaire percutanée, chirurgie du canal carpien
 - Interventions dentaires: la plupart des interventions sont associées à un risque hémorragique très limité et ne nécessitent pas d'ajustement du traitement antithrombotique ou seulement un ajustement minimal, à condition de prendre suffisamment de mesures préventives et péri-opératoires pour prévenir et minimiser l'hémorragie.
 - Les recommandations suivantes peuvent être données pour les différents antithrombotiques (sources: guidelines ACCP, recommandations UZGent et guideline du Kennisinstituut Mondzorg).
 - *Acide acétylsalicylique*
 - Patients à faible risque cardio-vasculaire: arrêter l'acide acétylsalicylique 5 à 7 jours avant l'intervention.
 - Patients à haut risque cardio-vasculaire: la prise d'acide acétylsalicylique ne doit pas être interrompue systématiquement:
 - en cas d'intervention à faible risque hémorragique, ne pas interrompre le traitement;
 - en cas d'intervention à risque hémorragique élevé, arrêter l'acide acétylsalicylique 5 à 7 jours avant l'intervention.
 - Il n'existe pas suffisamment d'arguments pour recommander un relais par héparine.



- Reprendre le traitement 12-24 heures après l'intervention.
- *Inhibiteurs du récepteur P2Y (éventuellement en association avec de l'acide acétylsalicylique)*
 - Chez les patients présentant un haut risque de thrombose (3 à 6 premiers mois après un syndrome coronarien aigu ou la pose d'un stent), seules les interventions vitales sont pratiquées, en poursuivant le traitement antithrombotique, sauf en cas de risque hémorragique élevé.
 - Chez les autres patients, l'administration des inhibiteurs du récepteur P2Y peut être temporairement interrompue, mais le traitement antithrombotique sera poursuivi avec de l'acide acétylsalicylique. Une consultation préalable avec le cardiologue est fortement recommandée.
 - Si l'on décide d'interrompre l'administration de l'inhibiteur du récepteur P2Y : arrêter le clopidogrel 5 jours, le prasugrel au moins 7 jours et le ticagrélor au moins 3 jours avant une intervention programmée; la ticlopidine: 10 jours avant.
 - Il n'existe pas suffisamment d'arguments pour recommander l'un relais par héparine.
 - Reprendre le traitement 12-24 heures après l'intervention.
- *Héparines (tous types)*
 - Intervention à faible risque hémorragique: ne pas interrompre l'héparine.
 - Intervention à risque hémorragique élevé: la décision d'interrompre ou non l'héparine dépend de l'indication de l'héparinothérapie et doit être prise en concertation avec le médecin traitant.
 - Reprendre le traitement 12 à 24 heures après l'intervention.
- *Antagonistes de la vitamine K*
 - Intervention à faible risque hémorragique: ne pas interrompre l'antagoniste de la vitamine K.
 - Intervention à risque hémorragique élevé et à risque thromboembolique élevé: arrêter l'antagoniste de la vitamine K et le remplacer temporairement par une héparine de bas poids moléculaire (relais ou *bridging*).
 - Intervention à risque hémorragique élevé et à faible risque thromboembolique: arrêter l'antagoniste de la vitamine K sans le remplacer par une héparine de bas poids moléculaire.
 - En cas d'interruption du traitement par antagoniste de la vitamine K:
 - interrompre l'acénocoumarol 2 à 4 jours avant l'intervention
 - interrompre la phénprocoumone 7 à 10 jours avant l'intervention
 - interrompre la warfarine 5 jours avant l'intervention
 - reprendre l'antagoniste de la vitamine K 24 heures après l'intervention.
 - En cas de relais préopératoire par héparine de bas poids moléculaire:
 - initier l'HBPM 3 jours avant l'intervention à dose thérapeutique
 - administrer la dernière dose (moitié de la dose journalière) au plus tard 24 heures avant l'intervention
 - reprendre l'héparine 12-24 heures après l'intervention (ou plus tard en cas de risque hémorragique élevé)
 - poursuivre l'héparinothérapie jusqu'à obtention d'un INR thérapeutique.
- *Anticoagulants oraux directs*
 - Inhibiteurs du facteur Xa (apixaban, edoxaban, rivaroxaban):
 - Pour la plupart des interventions dentaires, il n'est pas nécessaire d'interrompre la prise; on peut éventuellement envisager de sauter la prise le matin de l'intervention.
 - Intervention à faible risque hémorragique: interrompre la prise 24 heures avant l'intervention.
 - Intervention à risque hémorragique élevé: interrompre la prise 48 heures avant l'intervention (indépendamment de la fonction rénale).
 - Inhibiteur de la thrombine (dabigatran):
 - Pour la plupart des interventions dentaires, il n'est pas nécessaire d'interrompre la prise;



- on peut éventuellement envisager de sauter la prise le matin de l'intervention.
- Etant en grande partie éliminé par voie rénale, l'interruption du traitement dépend de la fonction rénale et du risque hémorragique lié à l'intervention (entre 24 heures avant l'intervention en cas de fonction rénale normale et de faible risque hémorragique, et jusqu'à 4 jours avant l'intervention en cas d'insuffisance rénale sévère et de risque hémorragique élevé; voir le RCP).
- Pas de remplacement temporaire par une héparine de bas poids moléculaire.
- Reprendre le traitement 24 heures (faible risque hémorragique) à 48 heures (risque hémorragique élevé) après l'intervention.

2.1.1. Antiagrégants

Ce chapitre reprend successivement:

- l'acide acétylsalicylique
- les thiéno-pyridines (clopidogrel, prasugrel et ticlopidine)
- les inhibiteurs réversibles du récepteur P2Y (cangrélor, ticagrélor)
- le dipyridamole
- l'époprosténol
- les antagonistes des récepteurs GP IIb/IIIa (eptifibatide, tirofiban).

2.1.1.1. Acide acétylsalicylique

En induisant une inhibition irréversible de la cyclo-oxygénase, l'acide acétylsalicylique bloque la synthèse du thromboxane A₂, ce qui provoque une inhibition de l'agrégation plaquettaire.

Seules les préparations d'acide acétylsalicylique utilisées comme antiagrégants sont reprises ici; les préparations qui sont indiquées dans la fièvre et la douleur sont abordées au point 8.2.2.

Positionnement

- *Phase aiguë* d'un syndrome coronarien aigu, d'un AIT ou d'un AVC mineur, et phase aiguë d'un AVC grave après avoir exclu une hémorragie: une dose de charge unique de 160-325 mg d'acide acétylsalicylique (de préférence sous forme soluble; si des comprimés gastro-résistants sont administrés, demander au patient de les croquer) est administrée aussi rapidement que possible, suivie de 80-100 mg par jour, éventuellement en association avec un inhibiteur du récepteur P2Y (*voir 2.1.1.2.*).
- Prévention cardio-vasculaire *secondaire* après un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral:
 - l'acide acétylsalicylique (80-100 mg par jour, généralement sous la forme gastro-résistante) est le mieux documenté
 - après un infarctus du myocarde, un inhibiteur du récepteur P2Y est généralement associé à l'acide acétylsalicylique pendant 12 mois (*voir 2.1.1.2.*)
 - après la pose d'un stent coronarien, un inhibiteur du récepteur P2Y est associé à l'acide acétylsalicylique pendant 3 à 6 mois (*voir 2.1.1.2.*)
 - après un AIT ou un AVC mineur, un inhibiteur du récepteur P2Y est parfois associé à l'acide acétylsalicylique pendant les premières semaines (*voir 2.1.1.2.*).
- En prévention cardio-vasculaire *primaire*, plusieurs grandes RCT ont montré que l'acide acétylsalicylique n'a pas de place, même chez les patients diabétiques [*voir Folia d'avril 2019*].
- *Prévention thrombo-embolique en cas de fibrillation auriculaire*: chez les patients à faible risque, l'utilité d'une monothérapie par acide acétylsalicylique est fortement mise en doute, et elle n'est plus recommandée dans les guidelines les plus récents. L'association d'acide acétylsalicylique et de clopidogrel est moins efficace que les anticoagulants oraux et s'accompagne d'un risque hémorragique aussi élevé. Par conséquent, elle n'est utilisée dans la fibrillation auriculaire que lorsque les anticoagulants oraux sont contre-indiqués, ou ne sont pas souhaitables pour d'autres raisons, chez des



patients à faible risque hémorragique.

- *Douleur et fièvre*: la place de l'acide acétylsalicylique est très limitée. Le rapport bénéfice/risque dans ces indications est moins favorable que celui du paracétamol (*voir 8.1*).
- Chez les femmes enceintes à haut risque de pré-éclampsie, l'acide acétylsalicylique à faible dose (< 100 mg p.j.) est utilisé à titre préventif (*voir rubrique "Grossesse et allaitement"*). Cette indication ne figure pas dans le RCP.

Indications (synthèse du RCP)

- Infarctus aigu du myocarde et angor instable.
- Accident vasculaire cérébral ischémique aigu confirmé par imagerie.
- Prévention secondaire dans les groupes de patients suivants:
 - patients souffrant d'angor stable;
 - patients ayant déjà eu un infarctus du myocarde;
 - patients ayant déjà eu un AIT ou un AVC ischémique;
 - patients souffrant d'artériopathie périphérique;
 - patients ayant subi une angioplastie (coronaire ou périphérique) ou une chirurgie de revascularisation.

Contre-indications

- Hémorragie active et risque accru d'hémorragie.
- (Antécédents d') ulcère gastro-duodéal.
- Hypersensibilité aux salicylés ou aux autres AINS (hypersensibilité croisée possible).
- Enfants de moins de 12 ans atteints d'une infection virale (en particulier grippe et varicelle).
- Insuffisance rénale sévère, insuffisance hépatique sévère (à fortes doses) (RCP).

Effets indésirables

- Hémorragie: des problèmes d'hémorragie, tels que des hémorragies après une extraction dentaire, des hémorragies gastro-intestinales ou centrales peuvent survenir même avec de faibles doses d'acide acétylsalicylique, parfois même après une seule dose.
- Irritation locale de la muqueuse gastrique, même à faibles doses, avec parfois des hémorragies gastriques graves; ce risque est plus faible avec les formes solubles et les formes gastro-résistantes. Une protection gastrique par IPP est proposée chez les personnes âgées de plus de 80 ans et chez les patients à risque (*voir 3.1*).
- Réactions d'hypersensibilité (bronchospasme p.ex.), surtout chez les patients asthmatiques et présentant des polypes nasaux; il existe une hypersensibilité croisée avec les AINS.
- Risque possible de syndrome de Reye [*voir Folia de mars 2003 et Folia de septembre 2003*].

Grossesse et allaitement

- **Il est préférable d'éviter l'acide acétylsalicylique pendant la grossesse:**
 - **Premier trimestre: suspicion d'un effet tératogène et abortif en cas d'utilisation de doses élevées.**
 - **Troisième trimestre: risque de prolongement de la grossesse et du travail, et de fermeture prématurée du canal artériel en cas d'utilisation chronique de doses élevées.**
 - **En périnatal: risque d'hémorragies chez la mère, le fœtus et le nouveau-né.**
- L'utilisation d'acide acétylsalicylique à faible dose (< 100 mg p.j.) à partir de la fin du premier trimestre peut s'avérer utile chez certaines femmes à risque élevé de pré-éclampsie; il est recommandé d'arrêter la prise d'acide acétylsalicylique 5 à 10 jours avant la date prévue de l'accouchement [*voir Folia d'avril 2016*].
- Allaitement: on ne dispose pas de données concernant l'utilisation de faibles doses; l'utilisation de doses élevées d'acide acétylsalicylique pendant la période d'allaitement est déconseillée.



Interactions

- Risque accru d'hémorragie, en particulier d'hémorragie gastro-intestinale, en cas d'association à des médicaments antithrombotiques, des AINS (y compris les AINS COX-2 sélectifs), des ISRS ou des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradréline (IRSN).
- Risque accru de lésions gastro-intestinales en cas d'usage concomitant d'AINS. Le bénéfice gastro-intestinal des AINS COX-2 sélectifs disparaît en grande partie lorsqu'ils sont associés à l'acide acétylsalicylique.
- Association d'acide acétylsalicylique et d'AINS (indométacine, ibuprofène, naproxène): suspicion d'une diminution de l'effet cardioprotecteur de l'acide acétylsalicylique. En ce qui concerne l'ibuprofène: l'effet cardioprotecteur de l'acide acétylsalicylique pourrait être maintenu en administrant l'ibuprofène quelques heures après l'acide acétylsalicylique.
- Association d'acide acétylsalicylique (surtout à fortes doses) et de méthotrexate: risque accru d'effets indésirables du méthotrexate, surtout lorsque le méthotrexate est utilisé à fortes doses. Chez les patients dont la fonction rénale est normale et qui prennent de faibles doses de méthotrexate, le risque de toxicité accrue du méthotrexate est très faible.


Précautions particulières

- Concernant l'interruption préopératoire, voir 2.1.
- La prudence s'impose en cas d'insuffisance rénale et de faible poids corporel en raison d'un risque accru d'hémorragie.
- Risque accru d'hémorragie et de lésions gastro-intestinales lié à l'utilisation d'acide acétylsalicylique concomitamment à une consommation excessive ou chronique d'alcool.

Posologie

- Syndrome coronarien aigu (infarctus aigu du myocarde et angor instable: 160 à 325 mg dès que possible après l'apparition des premiers symptômes et de préférence sous forme soluble, puis passer à la prévention secondaire (80 à 100 mg p.j.).
- Phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral ischémique (après avoir exclu une hémorragie cérébrale): première dose de 160 à 325 mg, suivie de 80 à 100 mg par jour.
- Prévention: 80 à 100 mg par jour.


Préparations non gastro-résistantes

ASPIRINE (Bayer) 


acide acétylsalicylique
compr. sol.

30 x 100 mg 4,56 €

Préparations gastro-résistantes

ASA EG (EG) 


acide acétylsalicylique
compr. gastro-résist.

100 x 100 mg b  8,19 €


ASAFLOW (Orifarm Healthcare) 

acide acétylsalicylique

compr. gastro-résist.

56 x 80 mg b  7,47 €

112 x 80 mg b  8,51 €

168 x 80 mg b  10,06 €

168 x 80 mg 5,71 €

56 x 160 mg 10,80 €

(le conditionnement de 168 x 80 mg est disponible en blister et en pilulier)

CARDIOASPIRINE (Bayer) 

acide acétylsalicylique
compr. gastro-résist.

56 x 100 mg 7,96 €

84 x 100 mg 11,94 €



2.1.1.2. Inhibiteurs du récepteur P2Y

2.1.1.2.1. Thiénopyridines

Le clopidogrel, le prasugrel et la ticlopidine sont des inhibiteurs irréversibles du récepteur P2Y qui interfèrent avec l'activation plaquettaire. Le clopidogrel et le prasugrel sont des prodrogues qui sont métabolisées dans le foie en un métabolite actif.

Positionnement

- Le clopidogrel en monothérapie n'est utilisé dans la prévention cardio-vasculaire secondaire que lorsque l'acide acétylsalicylique est contre-indiqué ou n'est pas toléré, mais il n'a pas été étudié spécifiquement dans ces populations.
- Le clopidogrel et le prasugrel ont une place en phase aiguë d'un syndrome coronarien.
- Le clopidogrel et le prasugrel, en association à l'acide acétylsalicylique, ont une place après la mise en place d'un stent (3-6 mois) et après un syndrome coronarien aigu (généralement 12 mois). Passé ce délai, il n'est pas prouvé que le bénéfice éventuel l'emporte sur le risque hémorragique accru. Il n'est pas prouvé que le rapport bénéfice/risque du prasugrel soit meilleur que celui du clopidogrel (le prasugrel est plus efficace que le clopidogrel, mais il est associé à un plus grand risque hémorragique) [voir *Folia de janvier 2016*].
- L'association clopidogrel + acide acétylsalicylique est proposée peu après un AIT ou un AVC mineur [voir *Folia de juillet 2019*].
- Dans la prévention du risque thromboembolique dans la fibrillation auriculaire, l'association de clopidogrel et d'acide acétylsalicylique est moins efficace que les anticoagulants oraux et s'accompagne d'un risque hémorragique aussi élevé. Par conséquent, elle n'est utilisée dans la fibrillation auriculaire que lorsque les anticoagulants oraux sont contre-indiqués ou ne sont pas souhaitables pour d'autres raisons chez des patients à faible risque hémorragique.
- La ticlopidine n'a qu'une place très limitée, notamment en raison de ses effets indésirables hématologiques.

Indications (synthèse du RCP)

- Clopidogrel:
 - en monothérapie (voir rubrique "Positionnement"):
 - après un infarctus du myocarde;
 - après un accident vasculaire cérébral ischémique;
 - chez les patients souffrant d'une artériopathie périphérique.
 - en association à l'acide acétylsalicylique:
 - syndrome coronarien aigu;
 - après ACTP élective avec pose de stent;
 - les 3 premières semaines après un AIT ou un AVC mineur;
 - fibrillation auriculaire: prévention des événements thromboemboliques artériels chez les patients à faible risque hémorragique qui ne peuvent être traités par un anticoagulant oral (voir rubrique "Positionnement").
- Prasugrel (toujours en association à l'acide acétylsalicylique): syndrome coronarien aigu avec angioplastie coronaire percutanée.
- Ticlopidine: prévention des événements thromboemboliques artérielles, p.ex. en cas d'angioplastie coronaire et périphérique, et dans certains types d'hémodialyse (voir rubrique "Positionnement").

Contre-indications

- Hémorragie active et risque accru d'hémorragie.
- Prasugrel: aussi antécédent d'AVC ou d'AIT.



- Ticlopidine: aussi antécédents de leucopénie, thrombopénie, agranulocytose, purpura thrombocytopenique.
- Clopidogrel, prasugrel: également insuffisance hépatique sévère (RCP). Sur le site Web <https://www.geneesmiddelenbijlevercirrose.nl>, le clopidogrel est considéré comme “à éviter” en cas de cirrhose hépatique.

Effets indésirables

- Hémorragies (risque plus élevé avec le prasugrel qu'avec le clopidogrel).
- Toxicité hématologique, surtout avec la ticlopidine, moins avec le clopidogrel et le prasugrel: dépression médullaire (surtout neutropénie), purpura thrombotique thrombocytopenique.

Interactions

- Risque accru d'hémorragie en cas de prise de plusieurs antithrombotiques ou d'association des thiényopyridines à d'autres médicaments présentant un risque d'hémorragie tels les AINS, ISRS et inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSN).
- Le clopidogrel (prodrogue) est un substrat du CYP2C19, du CYP3A4 et de la P-gp, et un inhibiteur du CYP2B6 et CYP2C8 (voir Tableau Ic. dans Intro.6.3. et Tableau Id. dans Intro.6.3.). La transformation du clopidogrel en son métabolite actif peut être freinée par les inhibiteurs de la pompe à protons (surtout l'oméprazole, l'ésoméprazole et dans une moindre mesure le lansoprazole), avec diminution de l'effet antiagrégant et risque accru d'événements cardiovasculaires. Lorsqu'il est essentiel d'administrer le clopidogrel concomitamment avec un IPP, il est plus prudent d'éviter l'(és)oméprazole.
- La ticlopidine est un substrat du CYP2C19 et du CYP3A4 et un inhibiteur du CYP1A2, CYP2B6 et CYP2C19 (voir Tableau Ic. dans Intro.6.3.).

Précautions particulières

- Concernant l'interruption préopératoire: voir 2.1.
- La prudence s'impose en cas d'insuffisance rénale et de faible poids corporel en raison d'un risque accru d'hémorragie.
- Le clopidogrel est une prodrogue qui est transformée en métabolite actif en partie par le CYP2C19. Chez les métaboliseurs lents du CYP2C19 (par polymorphisme du CYP2C19), la formation du métabolite actif est moindre et l'effet sur la fonction plaquettaire peut être réduit.
- Ticlopidine: un contrôle régulier de la formule sanguine est nécessaire.

Clopidogrel

Posol.

prévention: 75 mg p.j. en 1 prise (en cas de syndrome coronarien aigu: éventuellement une dose de charge unique de 300 à 600 mg)

CLOPIDOGREL AB (Aurobindo)
clopidogrel (hydrogénosulfate)
compr. pellic.

28 x 75 mg R/ b 8,48 €
98 x 75 mg R/ b 16,33 €

CLOPIDOGREL EG (EG)
clopidogrel (bésilate)
compr. pellic.

28 x 75 mg R/ b 8,48 €
98 x 75 mg R/ b 16,33 €

CLOPIDOGREL (HCL) SANDOZ
(Sandoz)
clopidogrel (chlorhydrate)
compr. pellic.

28 x 75 mg R/ b 8,48 €
84 x 75 mg R/ b 14,73 €
98 x 75 mg R/ b 16,33 €

CLOPIDOGREL KRKA (KRKA)
clopidogrel (chlorhydrate)
compr. pellic.



28 x 75 mg R/ b 8,48 €
84 x 75 mg R/ b 14,77 €
100 x 75 mg R/ b 16,58 €

CLOPIDOGREL TEVA (Teva)
clopidogrel (hydrogénosulfate)
compr. pellic.

100 x 75 mg R/ b 16,53 €

CLOPIDOGREL VIATRIS (Viatris)
clopidogrel (bésilate)
compr. pellic.



30 x 75 mg R/ b  8,69 €
90 x 75 mg R/ b  15,40 €

PLAVIX (Sanofi Belgium)
clopidogrel (hydrogénosulfate)




compr. pellic.
30 x 300 mg U.H. [43 €]

Prasugrel


Posol.

5 à 10 mg p.j. en 1 prise; chez les patients âgés de plus de 75 ans et les patients pesant moins de 60 kg: 5 mg p.j.

EFIENT (Substipharma)
prasugrel (chlorhydrate)
compr. pellic.


28 x 5 mg R/ b  28,47 €
28 x 10 mg R/ b  28,47 €
84 x 10 mg R/ b  70,57 €

EFIENT (PI-Pharma)
prasugrel (chlorhydrate)
compr. pellic.


84 x 10 mg R/ b  70,57 €
(distribution parallèle)

Ticlopidine


TICLID (Eurocept)
ticlopidine, chlorhydrate
compr. pellic.

60 x 250 mg R/ a  23,18 €

TICLID (Impexeco)
ticlopidine, chlorhydrate
compr. pellic.

60 x 250 mg R/ a  23,18 €
(importation parallèle)

TICLOPIDINE TEVA (Teva)
ticlopidine, chlorhydrate
compr. pellic.

90 x 250 mg R/ a  27,91 €

2.1.1.2.2. Inhibiteurs réversibles du récepteur P2Y

Le cangrélor et le ticagrélor sont des antiagrégants chimiquement apparentés à l'adénosine. Ce sont des inhibiteurs directs (pas des prodrogues) et réversibles du récepteur P2Y.

Positionnement

- La place du ticagrélor par rapport aux autres antiagrégants dans la prise en charge de la maladie coronarienne n'est pas claire. Il a principalement été étudié dans le syndrome coronarien aigu avec stent.
- Le cangrélor est administré par voie intraveineuse et constitue donc une alternative aux inhibiteurs du récepteur P2Y administrés par voie orale, lorsque l'administration par voie orale n'est pas possible, mais outre cette utilisation, il ne présente pas de bénéfice clair par rapport au clopidogrel: le cangrélor n'est pas plus efficace et il est beaucoup plus coûteux [voir *Folia de mars 2019*].

Indications (synthèse du RCP)

- Cangrélor: réduction des événements cardiovasculaires thrombotiques lors d'une intervention coronaire percutanée, en association avec l'acide acétylsalicylique, chez des patients n'ayant pas reçu d'inhibiteur oral des récepteurs P2Y avant cette intervention et chez qui la voie orale d'un tel traitement n'est ni faisable, ni souhaitable.
- Ticagrélor: prévention des événements thromboemboliques artériels, toujours en association à l'acide acétylsalicylique chez les patients
 - présentant un syndrome coronarien aigu;
 - présentant des antécédents d'infarctus du myocarde et à risque thrombo-embolique élevé.



Contre-indications

- Hémorragie active et risque accru d'hémorragie.
- Cangrélor: aussi antécédent d'AVC ou d'AIT.
- Ticagrélor: aussi antécédent d'hémorragie intracrânienne, insuffisance hépatique sévère (RCP).

Effets indésirables

- Hémorragie (risque plus élevé qu'avec le clopidogrel).
- Dyspnée.
- Troubles de la conduction cardiaque (avec des pauses ventriculaires, surtout lors de l'instauration du traitement).
- Rarement: réactions d'hypersensibilité.
- Ticagrélor: aussi céphalées, hyperuricémie.

Interactions

- Risque accru d'hémorragie en cas de prise de plusieurs antithrombotiques ou d'association à d'autres médicaments présentant un risque d'hémorragie tels les AINS, ISRS et inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSN).
- Le cangrélor ne doit pas être administré en même temps que le clopidogrel parce que le cangrélor diminue l'effet anti-plaquettaire du clopidogrel.
- Le ticagrélor est un substrat et inhibiteur du CYP3A4 et un substrat et inhibiteur de la P-gp (*voir Tableau Ic. dans Intro.6.3. et Tableau Id. dans Intro.6.3.*).

Précautions particulières

- Concernant l'interruption préopératoire: *voir 2.1.*
- La prudence s'impose en cas d'insuffisance rénale et de faible poids corporel en raison d'un risque accru d'hémorragie.
- Prudence chez les patients avec un risque de bradycardie, ainsi que chez les patients asthmatiques ou atteints de BPCO.

Cangrélor

KENGREXAL (Chiesi)

cangrélor (sodium)

sol. inj./perf. à diluer (pdr) i.v. [flac.]

10 x 50 mg U.H. [2.968 €]

Ticagrélor

Posol.

- syndrome coronarien aigu: 180 mg p.j. en 2 prises (après une dose de charge unique de 180 mg)

- antécédents d'infarctus du myocarde: 120 mg p.j. en 2 prises*

* avec la spécialité actuellement disponible en Belgique, il n'est plus possible d'obtenir la posologie pour cette indication

BRILIQUE (AstraZeneca)

ticagrélor

compr. pellic.

56 x 90 mg R/ b [†] ○ 75,25 €

168 x 90 mg R/ b [†] ○ 204,75 €

compr. orodisp.



10 x 90 mg U.H. [11 €]

2.1.1.3. Dipyridamole

Le dipyridamole inhibe la recapture de l'adénosine dans les plaquettes et inhibe ainsi l'agrégation plaquettaire. Le dipyridamole n'est plus disponible depuis novembre 2022.

Positionnement

- En ce qui concerne le dipyridamole en monothérapie, les preuves d'efficacité dans la prévention cardiovasculaire sont très faibles.

Indications (synthèse du RCP)

- Prévention des complications thromboemboliques chez les patients porteurs de prothèses valvulaires, en association à un antagoniste de la vitamine K.

Effets indésirables

- Hémorragie.
- Troubles gastro-intestinaux, céphalées, bouffées de chaleur, hypotension.

Interactions

- Risque accru d'hémorragie en cas de prise de plusieurs antithrombotiques ou d'association du dipyridamole à d'autres médicaments présentant un risque d'hémorragie tels les AINS, ISRS et inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSN).
- Augmentation de l'effet de l'adénosine par le dipyridamole: une diminution de la dose d'adénosine s'impose.

Précautions particulières

- Concernant l'interruption préopératoire: voir 2.1.
- La prudence s'impose en cas d'insuffisance rénale et de faible poids corporel en raison d'un risque accru d'hémorragie.

La spécialité **Dipyridamole EG®** n'est plus commercialisée depuis novembre 2022.

Posol.

prévention chez les patients porteurs de prothèses valvulaires: 300 à 450 mg p.j. en plusieurs prises, en association à un antagoniste de la vitamine K

2.1.1.4. Époprosténol

L'époprosténol est une prostaglandine naturelle (PGI₂), ce type de prostaglandine étant formé dans la paroi vasculaire. Contrairement à d'autres prostaglandines, l'époprosténol est un inhibiteur puissant de l'agrégation plaquettaire (effet dose-dépendant) et un puissant vasodilatateur.

Indications (synthèse du RCP)

- Dans l'hémodialyse, en situation d'urgence, lorsque l'utilisation de l'héparine comporte un risque hémorragique trop élevé, ou lorsque l'héparine est contre-indiquée.
- Hypertension pulmonaire.

Contre-indications

- Dysfonction ventriculaire gauche sévère.



Effets indésirables

- Hémorragie, thrombopénie.
- Bouffées de chaleur, céphalées, troubles gastro-intestinaux, douleur au niveau de la mâchoire.
- Hypotension, brady- et tachycardie.

Interactions

- Risque accru d'hémorragie en cas de prise de plusieurs antithrombotiques ou d'association de l'époprosténol à d'autres médicaments présentant un risque d'hémorragie tels les AINS, ISRS et inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSN).

FLOLAN (GSK)

époprosténol (sodium)

sol. perf. (pdr + solv.) i.v. [2x flac., formule thermostable]

1 x 0,5 mg + 50 ml solv. U.H. [43 €]

sol. perf. (pdr + solv.) i.v. [3x flac., formule thermostable]

1 x 1,5 mg + 2x 50 ml solv. U.H. [54 €]

(médicament orphelin)

VELETRI (Janssen-Cilag)

époprosténol (sodium)

sol. perf. à diluer (pdr) i.v. [flac.]

1 x 0,5 mg U.H. [43 €]

1 x 1,5 mg U.H. [54 €]

2.1.1.5. Antagonistes des récepteurs de la glycoprotéine IIb/IIIa

Léptifibatide et le tirofiban sont des antagonistes des récepteurs de la glycoprotéine IIb/IIIa qui interviennent dans l'agrégation plaquettaire.

Indications (synthèse du RCP)

- Traitement précoce des patients souffrant d'angor instable ou d'infarctus du myocarde sans sus-décalage du segment ST, afin de prévenir le développement d'un infarctus.

Contre-indications

- Hémorragie active et risque accru d'hémorragie.
- Eptifibatide: aussi insuffisance rénale sévère; insuffisance hépatique sévère (RCP).

Effets indésirables

- Hémorragie.
- Thrombopénie.
- Rarement: réactions d'hypersensibilité.

Interactions


- Risque accru d'hémorragie en cas de prise de plusieurs antithrombotiques ou d'association des antagonistes des récepteurs de la glycoprotéine IIb/IIIa à d'autres médicaments présentant un risque d'hémorragie tels que AINS, ISRS et inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSN).

Eptifibatide

La spécialité **Integrilin®** n'est plus commercialisée depuis février 2024.



Tirofiban

AGGRASTAT (Correvio) 

tirofiban (chlorhydrate)

sol. perf. i.v. [sac]

1 x 250 ml 0,05 mg / 1 ml U.H. [156 €]

sol. perf. à diluer i.v. [flac.]

1 x 50 ml 0,25 mg / 1 ml U.H. [156 €]

2.1.2. Anticoagulants

Ce chapitre reprend successivement:

- les anticoagulants oraux:
 - les antagonistes de la vitamine K
 - les anticoagulants oraux directs (AOD)
- les anticoagulants par voie parentérale:
 - les héparines: héparines non fractionnées, héparines de bas poids moléculaire et héparinoïdes
 - la bivalirudine
 - le fondaparinux
 - la protéine C
 - l'antithrombine.

Positionnement

- Les avantages d'un traitement anticoagulant doivent toujours être mis en balance avec le risque hémorragique.
- *Prévention et traitement de la thromboembolie artérielle:*
 - Traitement en phase aiguë d'un syndrome coronarien aigu (certains anticoagulants par voie parentérale)
 - Prévention chez les patients porteurs de prothèses valvulaires et en cas de valvulopathie cardiaque: chez les porteurs de valves mécaniques et en cas de sténose mitrale modérée à sévère, les AOD sont contre-indiqués et les antagonistes de la vitamine K restent la seule option. La place des AOD reste incertaine pendant les 3 premiers mois suivant la pose d'une bioprothèse valvulaire, parce qu'il n'est pas certain qu'ils confèrent une protection équivalente à celle des antagonistes de la vitamine K. Chez les patients souffrant d'une valvulopathie autre qu'une sténose mitrale, ou au-delà des 3 mois après la pose d'une bioprothèse valvulaire, les AOD sont considérés, dans les guidelines les plus récents, comme une bonne alternative aux antagonistes de la vitamine K lorsqu'une anticoagulation est indiquée.
 - Prévention chez les patients atteints de fibrillation auriculaire: dans la fibrillation auriculaire (FA), l'approche antithrombotique est au moins aussi importante que l'approche antiarythmique (*voir 1.8*). Des antagonistes de la vitamine K et des AOD peuvent être utilisés, leur profil d'efficacité et d'innocuité est similaire [*Folia de janvier 2020*]. Chez certains patients présentant un faible risque thrombotique, le traitement antithrombotique peut toutefois être omis parce que ses bénéfices ne l'emportent pas sur ses inconvénients. Différentes échelles permettent d'évaluer le risque thromboembolique dans la FA, dont le score CHADS-VASc, fréquemment utilisé [*voir Folia de mars 2012*]; pour évaluer le risque hémorragique, le score HAS-BLED est souvent utilisé.
- Pour la *prévention de la thrombose veineuse profonde*, on utilise des héparines de bas poids moléculaire, des antagonistes de la vitamine K ou des anticoagulants oraux directs (AOD). L'intérêt des anticoagulants est bien établi en prévention dans les situations à risque élevé (p.ex. chirurgie orthopédique majeure, chirurgie abdominale ou pelvienne). En ce qui concerne la prévention dans les situations associées à un moindre risque (p.ex. patients alités), il convient d'évaluer le rapport bénéfice/risque.



- Pour le *traitement de la thrombose veineuse profonde et de l'embolie pulmonaire*, des héparines de bas poids moléculaire ou des anticoagulants oraux directs (AOD) sont administrés initialement: leur efficacité et leur innocuité sont comparables. Seuls les AOD apixaban et rivaroxaban ont été étudiés en traitement initial dans cette indication; le dabigatran et l'edoxaban ont seulement été étudiés après un traitement initial par HBPM. Pour la poursuite du traitement pendant quelques mois, on a recours aux antagonistes de la vitamine K ou aux AOD. Dans certains cas (contre-indications aux antagonistes de la vitamine K et aux AOD, grossesse, patients atteints de cancer), le traitement peut également être poursuivi avec des HBPM.
- Le fait de ne pas pouvoir surveiller un traitement par AOD (surtout chez les patients insuffisants rénaux), l'absence d'antidote pour certains et le coût beaucoup plus élevé doivent être mis en balance avec la plus grande facilité d'utilisation des AOD par rapport aux antagonistes de la vitamine K [voir *Folia de janvier 2017 et Folia de janvier 2020*].
- L'héparine non fractionnée (classique) est encore utilisée pour une anticoagulation aiguë dans certains cas (p.ex. instabilité hémodynamique, risque très élevé de saignement, insuffisance rénale sévère).
- La place du danaparoiide, du fondaparinux et de la bivaluridine est limitée aux situations aiguës ou aux patients pour lesquels le traitement habituel n'est pas approprié.

2.1.2.1. Anticoagulants oraux

2.1.2.1.1. Antagonistes de la vitamine K

Les antagonistes de la vitamine K (anticoagulants coumariniques) inhibent la synthèse hépatique des facteurs de coagulation II (prothrombine), VII, IX et X, ainsi que celle de la protéine C et de la protéine S, des inhibiteurs de la coagulation.

Tableau 2a. INFLUENCE DES MÉDICAMENTS SUR L'EFFET DES ANTAGONISTES DE LA VITAMINE K

Les informations proviennent essentiellement d'observations avec la warfarine, mais on suppose que l'avertissement concerne également les autres antagonistes de la vitamine K. Lorsque toute une classe de médicaments est concernée, nous mentionnons la classe, sans énumérer chaque médicament appartenant à cette classe.

<p>AUGMENTATION OU DIMINUTION DE L'EFFET</p> <p>A été décrite avec les <i>classes</i> et les médicaments suivants:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Antirétroviraux contre le VIH</i> (voir www.hiv-druginteractions.org)• <i>Médicaments antitumoraux</i> (voir www.cancer-druginteractions.org)• <i>Médicaments de l'hépatite C chronique</i> (voir www.hep-druginteractions.org)• Phénytoïne
<p>AUGMENTATION DE L'EFFET</p> <p>A été décrite avec les <i>classes</i> et les médicaments suivants:</p> <ul style="list-style-type: none">• Acide acétylsalicylique• Acides gras oméga-3 (surtout à fortes doses)• <i>AINS</i>• Amiodarone• <i>Androgènes et stéroïdes anabolisants</i>• <i>Antibiotiques</i>• <i>Autres antithrombotiques (antiagrégants, anticoagulants, thrombolytiques)</i>• Capécitabine• <i>Céphalosporines (surtout la céfazoline)</i>• Cimétidine• <i>Corticostéroïdes (en cas d'utilisation systémique de fortes doses)</i>• Co-trimoxazole• Déférasirox



- Disulfirame
- *Fibrates*
- Fluconazole
- Fluorouracil
- *ISRS et IRSN*
- Itraconazole
- Léflunomide
- Lévothyroxine
- Métronidazole (probablement aussi avec l'ornidazole)
- Miconazole (toutes les formes d'administration)
- Noscapine
- Orlistat
- Piroxicam
- Propafénone
- *Statines (surtout la rosuvastatine)*
- Sulfaméthoxazole
- Tamoxifène
- Tégafur
- Tibolone
- Voriconazole
- Vortioxétine

DIMINUTION DE L'EFFET

A été décrite avec les substances suivantes:

- Aprépitant
- Azathioprine
- Bosentan
- Carbamazépine
- Colestyramine
- Enzalutamide
- Fosaprépitant
- Fumée de cigarettes
- Létermovir
- Mercaptopurine
- Millepertuis
- Phénobarbital
- Primidone
- Propylthiouracile
- Rifampicine (également possible avec la rifabutine, la rifamycine et la rifaximine)
- Tériflunomide
- Thiamazol
- Vitamine K

Positionnement

- *Voir 2.1.2.*
- Les antagonistes de la vitamine K restent la seule option chez les porteurs de valves mécaniques, dans les 3 premiers mois suivant la pose d'une bioprothèse valvulaire et chez les patients atteints de FA avec une sténose mitrale modérée à sévère. Les antagonistes de la vitamine K sont également la seule option chez les patients atteints du syndrome des antiphospholipides.
- Les antagonistes de la vitamine K restent aussi un traitement bien documenté chez de nombreux patients



lorsqu'une anticoagulation orale prolongée est souhaitée [voir *Folia de janvier 2017* et *Folia de janvier 2020*]. L'allongement du temps de prothrombine permet d'évaluer l'effet des antagonistes de la vitamine K, et est exprimé en *International Normalized Ratio* (INR).

- Les antagonistes de la vitamine K disponibles en Belgique sont l'acénocoumarol (demi-vie de 8 heures, ce qui correspond à un effet anticoagulant de 48 heures après la dernière prise), la warfarine (demi-vie de 20 à 60 heures, correspondant à une période d'anticoagulation de 2 à 5 jours après la dernière prise) et la phenprocoumone (demi-vie de 140 à 160 heures, ce qui correspond à un effet anticoagulant de 1 à 2 semaines après la dernière prise).
- Les antagonistes de la vitamine K à longue demi-vie offrent une anticoagulation plus stable.
- La warfarine est l'antagoniste de la vitamine K le mieux étudié.
- Les antagonistes de la vitamine K sont souvent déjà instaurés au cours de l'héparinothérapie et l'héparine est poursuivie quelques jours jusqu'à ce que la valeur cible de l'INR soit atteinte.

Indications (synthèse du RCP)

- Traitement et prévention des maladies thromboemboliques, comme dans la thrombose veineuse profonde et l'embolie pulmonaire, à la suite d'un traitement initial par l'héparine.
- Prothèses valvulaires cardiaques.
- Fibrillation auriculaire: en prévention secondaire (après un AIT ou un AVC), et chez la plupart des patients aussi en prévention primaire [voir *Fiche de transparence "Fibrillation auriculaire"* et *Folia de janvier 2017*].

Contre-indications

- Hémorragie active et risque accru d'hémorragie.
- Endocardite bactérienne aiguë.
- Hypertension sévère non contrôlée.
- Rétinopathie diabétique.
- **Grossesse (en particulier premier trimestre et fin de grossesse).**
- Acénocoumarol et warfarine: insuffisance rénale sévère, insuffisance hépatique sévère (RCP).

Effets indésirables

- **Les antagonistes de la vitamine K sont des médicaments à marge thérapeutique-toxique étroite.**
- Hémorragie.
- Augmentation transitoire des enzymes hépatiques.
- Rarement: nécrose cutanée, réactions allergiques.

Grossesse et allaitement

- **Pendant la grossesse, les antagonistes de la vitamine K sont contre-indiqués au cours du premier trimestre (effet tératogène) et en fin de grossesse (risque accru d'hémorragies chez la mère et le nouveau-né).** Dans la plupart des indications, un relais par une héparine de bas poids moléculaire est préférable, mais en thromboprophylaxie chez les femmes porteuses de prothèses valvulaires mécaniques, les HBPM n'ont pas été suffisamment étudiées. Dans de rares indications (femmes porteuses de prothèses valvulaires mécaniques), les antagonistes de la vitamine K peuvent être poursuivis pendant toute la grossesse; certaines sources privilégient l'acénocoumarol dans ce cas-là.
- Les femmes en âge de procréer traitées par un antagoniste de la vitamine K doivent utiliser une contraception adéquate. Tout désir de grossesse doit être discuté suffisamment tôt avec les médecins traitants pour qu'un plan de grossesse puisse être établi, dans lequel seront définis les modalités et le timing d'un éventuel relais par HBPM et un suivi rigoureux.

Interactions

- Risque accru d'hémorragie en cas de prise de plusieurs antithrombotiques ou d'association des antagonistes de la vitamine K à d'autres médicaments présentant un risque d'hémorragie tels les AINS,



ISRS et inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSN).

- Certains médicaments, certains produits à base de plantes et certaines denrées alimentaires peuvent influencer l'effet anticoagulant des antagonistes de la vitamine K par des mécanismes pharmacodynamiques ou pharmacocinétiques (dans ce dernier cas, principalement par action sur leur métabolisme).
- Les interactions pharmacodynamiques concernent les trois antagonistes de la vitamine K disponibles. Les interactions pharmacocinétiques concernent certainement la warfarine, qui est la mieux documentée, mais probablement aussi l'acénocoumarol et la phenprocoumone.
- Les principales interactions sont reprises dans le *Tableau 2a. dans 2.1.2.1.1.*
- Toute association de médicament doit se faire avec prudence. Il est nécessaire dans ce cas de mesurer plus fréquemment l'INR, surtout en cas d'association d'un médicament figurant dans le *Tableau 2a. au point 2.1.2.1.1.*
- Les antagonistes de la vitamine K sont des substrats du CYP2C9; la warfarine est en outre un substrat du CYP1A2 (voir *Tableau 1c. dans Intro.6.3.*).

Précautions particulières

- Concernant l'interruption préopératoire: voir 2.1.
- La prudence s'impose en cas d'insuffisance rénale et de faible poids corporel en raison d'un risque accru d'hémorragie.
- La valeur cible de l'INR dans la plupart des indications est de 2 à 3; en présence de certaines prothèses valvulaires mécaniques, un INR de 2,5 à 3,5 doit être visé [voir *Folia de février 2009*]. La posologie doit être adaptée en fonction de l'INR.
- Lors de toute modification de traitement (en particulier lors de l'ajout ou de l'arrêt d'un médicament figurant dans le *Tableau 2a. du point 2.1.2.1.1.*) chez un patient traité par un antagoniste de la vitamine K, il convient de contrôler rapidement l'INR.
- Chez les patients âgés, qui sont plus sensibles aux antagonistes de la vitamine K, il est plus difficile d'obtenir un INR stable.
- En l'absence de troubles hépatiques, une consommation limitée ou modérée d'alcool ne semble pas influencer l'effet des antagonistes de la vitamine K. En cas de consommation chronique, excessive d'alcool, il peut être nécessaire d'administrer des doses plus élevées que prévu de l'antagoniste de la vitamine K (métabolisation hépatique accélérée). En cas de consommation occasionnelle, excessive d'alcool (*binge drinking*), des variations importantes de l'INR ont été décrites, en particulier chez les patients insuffisants hépatiques.
- Certains patients sont, pour des raisons génétiques, particulièrement sensibles à la warfarine.
- **Surdosage:**
 - si l'INR < 5,0 sans hémorragie significative: diminuer la dose hebdomadaire de 10 à 20% (contrôler l'INR après 1 semaine);
 - si l'INR est compris entre 5,0 et 9,0 sans hémorragie significative:
 - en cas de faible risque d'hémorragie: sauter 1 à 2 doses; reprendre la warfarine, en diminuant la dose de 30%, dès que l'INR est à nouveau $\leq 3,0$ (contrôle de l'INR tous les 2 jours);
 - en cas de risque hémorragique élevé (p.ex. âge avancé, antécédents d'hémorragie): arrêter l'antagoniste de la vitamine K et administrer 1 à 2 mg de vitamine K par voie orale (voir 14.2.1.4.); reprendre la warfarine, en diminuant la dose de 30%, dès que l'INR est à nouveau $\leq 3,0$ (contrôle de l'INR tous les 2 jours).
 - Si l'INR > 9,0 sans hémorragie significative: arrêter l'antagoniste de la vitamine K et administrer 2-4 mg de vitamine K par voie orale (voir 14.2.1.4.); administrer encore 2 à 4 mg de vitamine K (par voie orale) si l'INR est toujours supérieur à 5,0 après 24 heures; reprendre la warfarine, en diminuant la dose d'au moins 30%, dès que l'INR est à nouveau $\leq 3,0$.
 - En cas d'hémorragie grave, indépendamment de l'augmentation de l'INR: hospitalisation d'urgence; en contexte hospitalier, la vitamine K peut être administrée lentement par voie intraveineuse (5 à 10




mg au début, à répéter si l'INR n'a pas suffisamment diminué après 3 heures; max 40 mg/24h), associée, en situation d'urgence, à l'administration d'un concentré de complexe prothrombinique (CCP, un concentré des facteurs de coagulation II, VII, IX et X) ou éventuellement du plasma frais (pas un premier choix).

Posologie

- La posologie nécessaire pour atteindre le degré d'anticoagulation souhaité (INR) est très variable d'un individu à l'autre.
- La valeur cible de l'INR dans la plupart des indications est de 2 à 3; en présence de certaines prothèses valvulaires mécaniques, un INR de 2,5 à 3,5 doit être visé [voir *Folia de février 2009*].
- L'utilisation d'une dose de charge ne se fait plus.
- Chez les personnes âgées, en cas de malnutrition et en cas de prise de médicaments susceptibles de provoquer des interactions, des doses initiales plus faibles sont recommandées.

Acénocoumarol


SINTROM (Merus Labs Luxco) 

acénocoumarol

compr.

100 x 1 mg R/ b  7,66 €

compr. (séc. en 4 non quantit.)


20 x 4 mg R/ b  7,21 €

Phenprocoumone


MARCOUMAR (Viatris) 

phenprocoumone

compr. (séc. en 4 quantit.)


25 x 3 mg R/ b  7,72 €

Warfarine

MAREVAN (Therabel) 

warfarine, sodium

compr. (séc. quantit.)

60 x 5 mg R/ b  14,65 €

2.1.2.1.2. Anticoagulants oraux directs (AOD)

Le dabigatran, l'apixaban, l'édoxaban et le rivaroxaban sont des AOD. Le dabigatran inhibe directement la thrombine; le dabigatran étéxilate est une prodrogue qui est métabolisée au niveau hépatique en son métabolite actif, le dabigatran. L'apixaban, l'édoxaban et le rivaroxaban sont des inhibiteurs spécifiques du facteur Xa.

Positionnement

- Voir 2.1.2.
- Le rivaroxaban à faible dose, associé à l'acide acétylsalicylique, a pour indication la prévention cardiovasculaire secondaire chez les patients atteints de coronaropathie et/ou d'artériopathie périphérique. Cependant, le rapport bénéfice/risque dans cette indication n'est pas clair: le bénéfice en termes de morbidité cardiovasculaire est environ aussi important que l'augmentation du risque hémorragique [voir *Folia de mai 2020*].



Indications (synthèse du RCP)

- Apixaban:
 - Chez l'adulte:
 - prévention de la thrombose veineuse profonde (TVP) et de l'embolie pulmonaire en cas de chirurgie orthopédique majeure (prothèse de la hanche ou du genou);
 - prévention thromboembolique dans la fibrillation auriculaire (FA) non valvulaire;
 - traitement et prévention secondaire de la TVP et de l'embolie pulmonaire.
- Dabigatran:
 - Chez l'adulte:
 - prévention de la TVP et de l'embolie pulmonaire en cas de chirurgie orthopédique majeure;
 - prévention thromboembolique dans la FA non valvulaire;
 - traitement et prévention secondaire de la TVP et de l'embolie pulmonaire.
 - Chez l'enfant:
 - traitement et prévention des récurrences d'événements thromboemboliques veineux (ETEV).
- Edoxaban:
 - Chez l'adulte:
 - prévention thromboembolique dans la FA non valvulaire;
 - traitement et prévention secondaire de la TVP et de l'embolie pulmonaire.
- Rivaroxaban:
 - Chez l'adulte:
 - prévention de la TVP et de l'embolie pulmonaire en cas de chirurgie orthopédique majeure;
 - prévention thromboembolique dans la FA non valvulaire;
 - traitement et prévention secondaire de la TVP et de l'embolie pulmonaire.
 - Faible dose (*voir rubrique "Positionnement"*):
 - prévention des complications athérogènes chez les patients atteints de coronaropathie ou d'artériopathie périphérique symptomatique et à haut risque d'événements ischémiques (toujours en association avec l'acide acétylsalicylique)
 - prévention des complications athérogènes après un syndrome coronarien aigu avec des biomarqueurs cardiaques élevés (toujours en association avec un ou plusieurs antiagrégants)
 - Chez l'enfant:
 - traitement et prévention des récurrences d'événements thromboemboliques veineux (ETEV).

Contre-indications

- Hémorragie active et risque accru d'hémorragie.
- Prothèses valvulaires mécaniques; pendant les 3 premiers mois après la pose d'une bioprothèse valvulaire.
- Sténose mitrale modérée à sévère.
- Hypertension sévère non contrôlée.
- Usage déconseillé chez les patients ayant des antécédents de thrombose et atteints du syndrome des antiphospholipides, le risque de récurrence de thrombose étant plus élevé qu'avec les antagonistes de la vitamine K [*voir Folia de janvier 2020*].
- Atteinte hépatique associée à une coagulopathie (RCP). Sur le site Web genesmiddelenbijlevercirrose.nl, le rivaroxaban est considéré comme « à éviter » en cas de cirrhose modérée à sévère.
- Dabigatran: aussi insuffisance rénale sévère (chez les enfants: DFGe < 50 ml/min/1,73m).

Effets indésirables

- **Les AOD sont des médicaments à marge thérapeutique-toxique étroite.**
- Hémorragie: le risque augmente en cas d'insuffisance rénale.
- Troubles gastro-intestinaux, élévation des enzymes hépatiques.



- Rare: thrombopénie.
- Dabigatran: aussi suspicion d'un risque légèrement accru d'infarctus du myocarde; lésions de l'œsophage si avalé avec trop peu d'eau (rare).
- Inhibiteurs du facteur Xa: aussi éruptions cutanées.

Grossesse et allaitement

- On dispose de très peu de données quant à un éventuel effet néfaste de ces médicaments pendant la grossesse et l'allaitement; la plus grande prudence est de rigueur.

Interactions

- Risque accru d'hémorragie en cas de prise de plusieurs antithrombotiques ou d'association des AOD à d'autres médicaments présentant un risque d'hémorragie tels les AINS, ISRS et inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSN).
- Risque accru d'hémorragie gastro-intestinale en cas d'association des AOD aux corticostéroïdes oraux.
- Le dabigatran est un substrat de la P-gp (voir *Tableau Id. dans Intro.6.3.*).
- L'apixaban est un substrat du CYP3A4 et de la P-gp (voir *Tableau Ic. dans Intro.6.3. et Tableau Id. dans Intro.6.3.*).
- L'édoxaban est un substrat de la P-gp (voir *Tableau Id. dans Intro.6.3.*).
- Le rivaroxaban est un substrat du CYP3A4 et de la P-gp (voir *Tableau Ic. dans Intro.6.3. et Tableau Id. dans Intro.6.3.*).

Précautions particulières

- Pour l'interruption préopératoire: voir 2.1.
- Contrôler la fonction rénale avant l'instauration du traitement et à intervalles réguliers chez les patients âgés de plus de 75 ans, ou lors de toute suspicion de diminution de la fonction rénale, indépendamment de l'âge du patient.
- Il est recommandé d'ajuster la dose selon la fonction rénale, l'âge et parfois également le poids corporel ou les traitements concomitants; ceci varie d'un produit à l'autre. Une diminution de la dose en dehors de ces critères est à éviter en raison du risque de sous-traitement [voir *Folia de décembre 2017 et Folia de juin 2020*].
- Lors du passage d'une héparine fractionnée à un AOD, il convient d'arrêter immédiatement l'héparine (pas de période de chevauchement).
- En cas d'hémorragie grave, du plasma frais ou un concentré de facteurs de coagulation peuvent être administrés en milieu hospitalier. Pour le dabigatran, l'idarucizumab, un anticorps monoclonal, est utilisé comme antidote (voir 20.1.1.4. et *Folia de mai 2016*). Pour l'apixaban et le rivaroxaban, l'andexanet alfa, un facteur Xa de coagulation recombinant et inactivé, est utilisé comme antidote (voir 20.1.1.5.). La supériorité de ces antidotes spécifiques par rapport aux concentrés de facteurs de coagulation n'a pas été démontrée.
- Une surveillance de l'effet du traitement anticoagulant (détermination de l'activité anti-Xa) est possible, mais une surveillance de routine n'est pas nécessaire selon les guides de pratique clinique. Un tel suivi coûte beaucoup plus cher que la détermination de l'INR et n'est remboursé que dans certaines situations en Belgique.
- Dabigatran:
 - La prudence s'impose chez les patients présentant une cardiopathie ischémique.
 - Pour une bonne absorption du médicament et pour prévenir des lésions œsophagiennes, les gélules doivent être avalées entières avec un grand verre d'eau.
 - Chez les enfants âgés de 8 à 12 ans, il est possible d'utiliser les gélules ou les granulés. En raison des différences de biodisponibilité, ces deux formes sont administrées à des posologies différentes: il est conseillé de consulter les RCP respectifs pour la posologie correcte, surtout lors du passage d'une formulation à une autre.




- Le rivaroxaban doit être pris avec des aliments, en particulier aux doses ≥ 15 mg, pour optimiser sa biodisponibilité.

Apixaban


Posol.


- prévention primaire de la TVP après pose programmée d'une prothèse totale de hanche ou de genou: 5 mg p.j. en 2 prises pendant 10-14 jours (genou) ou 32-38 jours (hanche)
- prévention thromboembolique dans la fibrillation auriculaire:
- traitement de la TVP et de l'embolie pulmonaire: 20 mg p.j. en 2 prises pendant 7 jours, ensuite 10 mg p.j. en 2 prises pendant 3 à 6 mois
- prévention secondaire de la TVP et de l'embolie pulmonaire (si indiqué, après traitement de 6 mois d'une TVP ou une embolie pulmonaire): 5 mg p.j. en 2 prises


ELIQUIS (Bristol-Myers Squibb) 


apixaban


compr. pellic.

20 x 2,5 mg R/ b  50,72 €


60 x 2,5 mg R/ b  84,56 €

168 x 2,5 mg R/ b  217,71 €

56 x 5 mg R/ b  79,62 €

168 x 5 mg R/ b  217,71 €

(distribution parallèle)

ELIQUIS (Abacus) 

apixaban

compr. pellic.

168 x 2,5 mg R/

168 x 5 mg R/

ELIQUIS (Orifarm Belgium) 

apixaban

compr. pellic.

168 x 2,5 mg R/

168 x 5 mg R/

(distribution parallèle)

Dabigatran


Posol.


- prévention primaire de la TVP après pose programmée d'une prothèse totale de hanche ou de genou:
- prévention thromboembolique dans la fibrillation auriculaire:
- traitement et prévention secondaire de la TVP et de l'embolie pulmonaire (après un traitement anticoagulant parentéral pendant au moins 5 jours):


PRADAXA (Boehringer Ingelheim) 


dabigatran, étexilate [sous forme de mésilate]


gél.


10 x 75 mg R/ b  13,33 €


60 x 75 mg R/ b  49,44 €

10 x 110 mg R/ b  13,33 €

60 x 110 mg R/ b  49,44 €

180 x 110 mg R/ b  130,72 €

60 x 150 mg R/ b  49,44 €

180 x 150 mg R/ b  130,72 €

gran. enr. (sachet)

60 x 20 mg R/ 294,02 €


60 x 30 mg R/ 294,02 €

60 x 40 mg R/ 294,02 €

60 x 50 mg R/ 294,02 €

60 x 110 mg R/ 294,02 €

60 x 150 mg R/ 294,02 €

PRADAXA (Abacus) 

dabigatran, étexilate [sous forme de mésilate]



gél.

180 x 150 mg R/ 130,23 €
(distribution parallèle)

Édoxaban

Posol.

- prévention thromboembolique dans la fibrillation auriculaire:
- traitement et prévention secondaire de la TVP et de l'embolie pulmonaire (après un traitement anticoagulant parentéral pendant au moins 5 jours):

LIXIANA (Daiichi Sankyo)

édoxaban (tosilate)

compr. pellic.

- 10 x 15 mg R/ b 33,32 €
- 28 x 30 mg R/ b 79,60 €
- 98 x 30 mg R/ b 252,13 €
- 28 x 60 mg R/ b 79,60 €
- 98 x 60 mg R/ b 252,13 €

Rivaroxaban

Posol.

- prévention primaire de la TVP après pose programmée d'une prothèse totale de hanche ou de genou: 10 mg p.j. en 1 prise pendant 2 semaines (genou) ou 5 semaines (hanche)
- prévention thromboembolique dans la fibrillation auriculaire:
- traitement de la TVP et de l'embolie pulmonaire: 30 mg p.j. en 2 prises pendant 21 jours, suivi de:
- prévention secondaire de la TVP et de l'embolie pulmonaire (si indiqué, après traitement d'au moins 6 mois d'une TVP ou une embolie pulmonaire): 10 mg p.j. en 1 prise; 20 mg p.j. en 1 prise si risque élevé de récurrence
- prévention cardiovasculaire secondaire pour des groupes cibles spécifiques (en association à l'acide acétylsalicylique): 5 mg p.j. en 2 doses

RIVAROXABAN SANDOZ (Sandoz)

rivaroxaban

compr. pellic.

- 56 x 2,5 mg R/ b 29,02 €
- 196 x 2,5 mg R/ b 82,48 €

RIVAROXABAN VIATRIS (Viatris)

rivaroxaban

compr. pellic.

- 56 x 2,5 mg R/ b 29,02 €
- 196 x 2,5 mg R/ b 82,48 €

XARELTO (Bayer)

rivaroxaban

compr. pellic.

- 56 x 2,5 mg R/ b 70,76 €
- 196 x 2,5 mg R/ b 222,07 €
- 10 x 10 mg R/ b 34,57 €

- 30 x 10 mg R/ b 88,16 €
- 98 x 10 mg R/ b 231,74 €
- 28 x 15 mg R/ b 73,64 €
- 42 x 15 mg R/ b 105,36 €
- 98 x 15 mg R/ b 231,74 €
- 28 x 20 mg R/ b 73,64 €
- 98 x 20 mg R/ b 231,74 €

susp. (gran.)

- 1 x 51,7 mg R/ 18,21 €
- 1 x 103,4 mg R/ 32,03 €

XARELTO (Abacus)

rivaroxaban

compr. pellic.

- 98 x 15 mg R/
(distribution parallèle)



2.1.2.2. Anticoagulants par voie parentérale

2.1.2.2.1. Héparines

2.1.2.2.1.1. Héparines non fractionnées

Positionnement

- Voir 2.1.2.
- Les héparines non fractionnées (classiques) sont de moins en moins utilisées dans la prévention thromboembolique veineuse.
- Les héparines non fractionnées (classiques) sont encore utilisées pour une anticoagulation aiguë dans certains cas (p.ex. instabilité hémodynamique, risque hémorragique très élevé, insuffisance rénale sévère). Elles ont pour avantages que leur effet est rapidement réversible et qu'elles ne sont pas éliminées par voie rénale.

Indications (synthèse du RCP)

- Traitement de l'embolie pulmonaire et de la thrombose veineuse profonde; aussi en prévention dans certaines interventions chirurgicales.
- Infarctus aigu du myocarde, angor instable.
- Prévention d'une thrombose au niveau d'une voie centrale et en cas de circulation extracorporelle, par ex. en cas de dialyse.

Contre-indications

- Hémorragie active et risque accru d'hémorragie.
- Administration de doses thérapeutiques dans les 24 heures et de doses prophylactiques dans les 12 heures précédant une intervention (épi)durale ou rachidienne (anesthésie, ponction).
- Thrombopénie et antécédents de thrombopénie induite par l'héparine.
- Hypertension sévère non contrôlée.
- Endocardite bactérienne aiguë.
- Rétinopathie diabétique.
- Insuffisance rénale sévère; insuffisance hépatique sévère (RCP).

Effets indésirables

- Hémorragie.
- Thrombopénie: fréquent (même dans les semaines qui suivent l'arrêt du traitement).
- Hyperkaliémie (voir Intro.6.2.7).
- Élévation transitoire des enzymes hépatiques.
- Rare: réactions allergiques; en cas d'utilisation prolongée: ostéoporose et alopecie réversible.

Grossesse et allaitement

- Les héparines sont considérées comme sûres pendant la grossesse et la période d'allaitement. L'héparinothérapie sera si possible interrompue peu de temps avant l'accouchement en raison du risque d'hémorragie.

Interactions

- Risque accru d'hémorragie en cas de prise de plusieurs antithrombotiques ou d'association des héparines à d'autres médicaments présentant un risque d'hémorragie tels les AINS, ISRS et inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSN).
- Augmentation du risque d'hyperkaliémie en cas d'association avec des diurétiques d'épargne potassique, des suppléments de potassium, des IECA, des sartans et des AINS.
- Risque accru de spasmes vasculaires provoqués par les dérivés de l'ergot.



Précautions particulières

- Concernant l'interruption préopératoire: voir 2.1.
- La prudence s'impose en cas d'insuffisance rénale et de faible poids corporel en raison d'un risque accru d'hémorragie.
- Suivre le temps de thromboplastine partielle activé (*Activated Partial Thromboplastin Time*, APTT ou temps de céphaline activé, TCA) en cas d'utilisation à dose curative.
- Suivre le taux de plaquettes en cas de traitement de plus de 5 jours, surtout pendant les premières semaines de traitement.
- Suivre la kaliémie en cas d'insuffisance rénale.
- Antidote: 1.000 UI de protamine par voie intraveineuse par 1.000 UI d'héparine (à renouveler si nécessaire, voir 20.1.1.2.).

Posol.

- traitement de la thrombose veineuse profonde et de l'embolie pulmonaire:

- perfusion i.v.: 20.000 à 40.000 UI par 24 heures, après un bolus i.v. de 5.000 ou 10.000 UI
- injection i.v.: 5.000 à 10.000 UI toutes les 4 à 6 heures (avec augmentation du risque d'hémorragie lors des pics de l'effet anticoagulant)
- injection s.c.: 10.000 UI toutes les 8 heures

- infarctus et angor instable: perfusion de 30.000 UI par 24 heures, après un bolus i.v. de 5.000 ou 10.000 UI

HEPARINE LEO (Leo)

héparine, sodium

sol. inj./perf. i.v. [flac.]

10 x 10 ml 100 UI / 1 ml R/ 33,67 €

50 x 5 ml 5.000 UI / 1 ml U.H. [213 €]

HEPARINE NATRIUM B. BRAUN (B. Braun)

héparine, sodium

sol. inj./perf. i.v. [flac.]

10 x 5 ml 5.000 UI / 1 ml U.H. [53 €]

2.1.2.2.1.2. Héparines de bas poids moléculaire

Positionnement

- Voir 2.1.2.
- Les héparines de bas poids moléculaire ont une longue demi-vie et une biodisponibilité élevée.
- En l'absence d'études comparatives directes, il n'est pas prouvé que les diverses molécules au sein de ce groupe diffèrent entre elles en termes d'efficacité et d'effets indésirables.

Indications (synthèse du RCP)

- Traitement et prévention secondaire de la thrombose veineuse profonde et de l'embolie pulmonaire.
- Prévention primaire de la thrombose veineuse profonde lors d'interventions chirurgicales à risque thrombogène modéré à élevé (p.ex. chirurgie orthopédique majeure, abdominale ou pelvienne), ou en cas d'immobilisation prolongée chez des patients alités atteints d'une affection médicale aiguë et à haut risque thromboembolique.
- Angor instable et syndrome coronarien aigu, en association à l'acide acétylsalicylique.
- Accident vasculaire cérébral ischémique aigu (confirmé par imagerie), en association à l'acide acétylsalicylique.
- En remplacement des antagonistes de la vitamine K pendant la grossesse ou en cas d'intervention avec



un risque hémorragique élevé.

- Prévention de la coagulation du circuit de circulation extracorporelle dans l'hémodialyse.

Contre-indications

- Hémorragie active et risque accru d'hémorragie.
- Administration de doses thérapeutiques dans les 24 heures et de doses prophylactiques dans les 12 heures précédant une intervention (épi)durale ou rachidienne (anesthésie, ponction).
- Thrombopénie et antécédents de thrombopénie induite par l'héparine.
- Hypertension sévère non contrôlée.
- Endocardite bactérienne aiguë.
- Rétinopathie diabétique.
- Nadroparine: aussi insuffisance rénale sévère (RCP).

Effets indésirables

- Hémorragie active et risque accru d'hémorragie.
- Thrombopénie: fréquent, mais risque plus faible qu'avec les héparines non fractionnées; des cas de thrombocytose ont également été signalés.
- Hyperkaliémie (*voir Intro.6.2.7*).
- Élévation transitoire des enzymes hépatiques.
- Rare: réactions allergiques; en cas d'utilisation prolongée (p.ex. grossesse): ostéoporose et alopecie réversible.

Grossesse et allaitement

- Les héparines de bas poids moléculaire sont considérées comme sûres pendant la grossesse et la période d'allaitement. L'héparinothérapie sera si possible interrompue 12-24 heures avant l'accouchement en raison du risque d'hémorragie chez la mère (hémorragies du post-partum, mais aussi risque d'hématome épidural en cas d'anesthésie épidurale).

Interactions

- Risque accru d'hémorragie en cas de prise de plusieurs antithrombotiques ou d'association des héparines de bas poids moléculaire à d'autres médicaments présentant un risque d'hémorragie tels les AINS, ISRS et inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSN).
- Risque accru d'hémorragie en cas d'association des héparines de bas poids moléculaire aux corticostéroïdes systémiques.
- Augmentation du risque d'hyperkaliémie en cas d'association avec des diurétiques d'épargne potassique, des suppléments de potassium, des IECA, des sartans et des AINS.
- Risque accru de spasmes vasculaires provoqués par les dérivés de l'ergot.

Précautions particulières

- Concernant l'interruption préopératoire: *voir 2.1*.
- La prudence s'impose en cas d'insuffisance rénale et de faible poids corporel en raison d'un risque accru d'hémorragie.
- Suivre le taux de plaquettes en cas de traitement de plus de 5 jours, surtout pendant les premières semaines de traitement.
- Suivre la kaliémie en cas d'insuffisance rénale.
- Antidote: la protamine ne neutralise que partiellement l'effet des héparines de bas poids moléculaire: 1.400 UI de protamine par voie intraveineuse neutralisent environ 1.000 UI anti-Xa d'une héparine de bas poids moléculaire (à renouveler si nécessaire) (pour la protamine, *voir 20.1.1.2*).



Posologie

- Les héparines de bas poids moléculaire sont administrées par voie sous-cutanée et ne nécessitent généralement pas de monitoring. Une adaptation de la dose s'impose en cas d'insuffisance rénale.
- Les concentrations des héparines de bas poids moléculaire dans les diverses spécialités sont exprimées ci-dessous en unités d'activité anti-facteur Xa (UI anti-Xa).
- La posologie mentionnée pour chaque produit est celle du traitement de la thrombose veineuse profonde et de l'embolie pulmonaire, et celle de la prévention des thromboembolies veineuses chez les patients à faible risque thromboembolique. En cas de haut risque thromboembolique, les doses seront plus élevées. Lors d'interventions chirurgicales, il n'est pas clairement établi si la première dose doit être administrée avant ou après l'intervention.
- Durée de traitement: en général, les HBPM sont seulement utilisées dans la phase initiale du traitement de la TVP. Les AOD dabigatran et édoxaban ne peuvent être instaurés en relais des HBPM qu'après un traitement initial par HBPM pendant au moins 5 jours. L'apixaban et le rivaroxaban peuvent être initiés immédiatement sans administration préalable d'HBPM. Si le traitement de la TVP sera poursuivi avec un antagoniste de la vitamine K, les deux médicaments sont initiés simultanément et l'HBPM est interrompue dès l'obtention d'un INR thérapeutique.

Daltéparine

La spécialité **Fragmin®** n'est plus commercialisée depuis novembre 2022.

Posol.

- traitement: 200 UI anti-Xa/kg/j. en 1 à 2 injections

- prévention: 2.500 UI anti-Xa p.j. en 1 injection; en cas de risque élevé: 5.000 UI anti-Xa p.j. en 1 à 2 injections

Énoxaparine

Posol.








- traitement: 150 UI anti-Xa/kg/j. en 1 injection, ou 100 UI anti-Xa/kg toutes les 12 heures

- prévention:

CLEXANE (Sanofi Belgium)








énoxaparine, sodium

sol. inj. i.v./s.c. [ser. préremplie]










- 10 x 2.000 UI anti-Xa / 0,2 ml (20 mg/0,2 ml) R/ b  26,38 €
- 10 x 4.000 UI anti-Xa / 0,4 ml (40 mg/0,4 ml) R/ b  43,62 €
- 10 x 6.000 UI anti-Xa / 0,6 ml (60 mg/0,6 ml) R/ b  50,65 €
- 10 x 8.000 UI anti-Xa / 0,8 ml (80 mg/0,8 ml) R/ b  57,64 €
- 10 x 10.000 UI anti-Xa / 1 ml (100 mg/1 ml) R/ b  64,68 €
- 10 x 12.000 UI anti-Xa / 0,8 ml (120 mg/0,8 ml) R/ b  89,89 €
- 10 x 15.000 UI anti-Xa / 1 ml (150 mg/1 ml) R/ b  93,56 €

énoxaparine, sodium

sol. inj. i.v./s.c. [ser. préremplie]

- 10 x 2.000 UI anti-Xa / 0,2 ml (20 mg/0,2 ml) R/ b  20,13 €
- 10 x 4.000 UI anti-Xa / 0,4 ml (40 mg/0,4 ml) R/ b  32,28 €
- 10 x 6.000 UI anti-Xa / 0,6 ml (60 mg/0,6 ml) R/ b  36,52 €
- 10 x 8.000 UI anti-Xa / 0,8 ml (80 mg/0,8 ml) R/ b  41,88 €
- 10 x 10.000 UI anti-Xa / 1 ml (100 mg/1 ml) R/ b  46,70 €
- 10 x 12.000 UI anti-Xa / 0,8 ml (120 mg/0,8 ml) R/ b  63,52 €
- 10 x 15.000 UI anti-Xa / 1 ml (150 mg/1 ml) R/ b  66,30 €

sol. inj. i.v./s.c. [ser. préremplie]

- 10 x 2.000 UI anti-Xa / 0,2 ml (20 mg/0,2 ml) R/ b  20,13 €
- 20 x 2.000 UI anti-Xa / 0,2 ml (20 mg/0,2 ml) R/ b  32,78 €
- 10 x 4.000 UI anti-Xa / 0,4 ml (40 mg/0,4 ml) R/ b  32,28 €
- 20 x 4.000 UI anti-Xa / 0,4 ml (40 mg/0,4 ml) R/ b  55,85 €
- 10 x 6.000 UI anti-Xa / 0,6 ml (60 mg/0,6 ml) R/ b  36,52 €
- 20 x 6.000 UI anti-Xa / 0,6 ml (60 mg/0,6 ml) R/ b  65,24 €
- 10 x 8.000 UI anti-Xa / 0,8 ml (80 mg/0,8 ml) R/ b  41,88 €
- 10 x 12.000 UI anti-Xa / 0,8 ml (120 mg/0,8 ml) R/ b  63,52 €
- 10 x 15.000 UI anti-Xa / 1 ml (150 mg/1 ml) R/ b  66,30 €

GHEMAXAN (Effik)

énoxaparine, sodium

ENOXAPARINE BECAT (MPI)



Nadroparine

Posol.


- traitement: 171 UI anti-Xa/kg/j en une injection (Fraxodi®), ou 86 UI anti-Xa/kg toutes les 12 heures (Fraxiparine®)


- prévention:


FRAXIPARINE (Viatris)


nadroparine, calcium


sol. inj. s.c. [ser. préremplie]

10 x 2.850 UI anti-Xa / 0,3 ml R/ b  27,96 €

10 x 3.800 UI anti-Xa / 0,4 ml R/ b  34,39 €

10 x 5.700 UI anti-Xa / 0,6 ml R/ b  43,93 €


10 x 7.600 UI anti-Xa / 0,8 ml R/ b  56,01 €


10 x 9.500 UI anti-Xa / 1 ml R/ b  68,17 €


FRAXODI (Viatris)

nadroparine, calcium

sol. inj. s.c. [ser. préremplie]

10 x 11.400 UI anti-Xa / 0,6 ml R/ b  77,84 €

10 x 15.200 UI anti-Xa / 0,8 ml R/ b  100,28 €

10 x 19.000 UI anti-Xa / 1 ml R/ b  122,68 €

Tinzaparine

Posol.


- traitement: 175 UI anti-Xa/kg/j. en 1 injection


- prévention:


INNOHEP (Leo)


tinzaparine, sodium


sol. inj. s.c. [ser. préremplie]

10 x 3.500 UI anti-Xa / 0,35 ml R/ b  30,33 €

10 x 4.500 UI anti-Xa / 0,45 ml R/ b  38,61 €

10 x 10.000 UI anti-Xa / 0,5 ml R/ b  75,73 €

10 x 14.000 UI anti-Xa / 0,7 ml R/ b  101,80 €

10 x 18.000 UI anti-Xa / 0,9 ml R/ b  121,58 €

2.1.2.2.1.3. Héparinoïdes

Le danaparoi de est un h parinoi de de bas poids mol culaire.

Positionnement

- Voir 2.1.2.

Indications (synth se du RCP)

- Pr vention et traitement de la thrombose veineuse profonde chez les patients pr sentant ou ayant des ant c dents d'une thrombop nie induite par l'h parine.

Contre-indications

- H morragie active et risque accru d'h morragie.



- Administration de doses thérapeutiques dans les 24 heures et de doses prophylactiques dans les 12 heures précédant une intervention (épi)durale ou rachidienne (anesthésie, ponction).
- Hypertension sévère non contrôlée.
- Endocardite bactérienne aiguë.
- Rétinopathie diabétique.
- Atteinte hépatique associée à une coagulopathie (RCP).

Effets indésirables

- Hémorragie.
- Augmentation transitoire des enzymes hépatiques, rash.
- Rare: thrombopénie.


Interactions

- Risque accru d'hémorragie en cas de prise de plusieurs antithrombotiques ou d'association des héparinoïdes à d'autres médicaments présentant un risque d'hémorragie tels les AINS, ISRS et inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSN).

Précautions particulières

- Concernant l'interruption préopératoire: voir 2.1.
- La prudence s'impose en cas d'insuffisance rénale et de faible poids corporel en raison d'un risque accru d'hémorragie.

Danaparoiide

ORGARAN (Viatris) 

danaparoiide, sodium

sol. inj./perf. i.v./s.c. [amp.]

10 x 750 UI anti-Xa / 0,6 ml U.H. [441 €]

2.1.2.2.2. Bivalirudine

La bivalirudine inhibe directement la thrombine.

Positionnement

- Voir 2.1.2.

Indications (synthèse du RCP)

- Anticoagulation en cas d'intervention coronaire percutanée, toujours en association à l'acide acétylsalicylique et au clopidogrel.
- Angor instable ou infarctus de myocarde, chez les patients devant bénéficier d'une intervention urgente.

Contre-indications

- Hémorragie active et risque accru d'hémorragie.
- Hypertension sévère non contrôlée.
- Endocardite bactérienne aiguë.
- Insuffisance rénale sévère (RCP).

Effets indésirables

- Hémorragie: le risque augmente en cas d'insuffisance rénale.
- Troubles gastro-intestinaux, augmentation transitoire des enzymes hépatiques.
- Rare: réactions anaphylactiques.



Grossesse et allaitement

- On dispose de très peu de données quant à un éventuel effet néfaste de la bivalirudine pendant la grossesse; la plus grande prudence est de rigueur.

Interactions

- Risque accru d'hémorragie en cas de prise de plusieurs antithrombotiques ou d'association de la bivalirudine à d'autres médicaments présentant un risque d'hémorragie tels les AINS, ISRS et inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSN).

Précautions particulières

- En cas d'hémorragie grave, du plasma frais ou un concentré de facteurs de coagulation peuvent être administrés.
- Il n'est pas possible de monitorer le traitement anticoagulant.

BIVALIRUDIN ACCORD HEALTHCARE (Accord) 

bivalirudine

sol. inj./perf. à diluer (pdr) i.v. [flac.]

5 x 250 mg U.H. [905 €]

2.1.2.2.3. Fondaparinux

Le fondaparinux est un inhibiteur synthétique spécifique du facteur Xa.

Positionnement

- Voir 2.1.2.

Indications (synthèse du RCP)

- Prévention de la thrombose veineuse profonde et de l'embolie pulmonaire en cas de chirurgie orthopédique majeure, et chez les patients à risque élevé après chirurgie abdominale et en cas d'immobilisation prolongée.
- Syndrome coronarien aigu (angor instable et infarctus du myocarde).
- Thrombose veineuse superficielle aiguë symptomatique et étendue des membres inférieurs.

Contre-indications

- Hémorragie active et risque accru d'hémorragie.
- Endocardite bactérienne.

Effets indésirables

- Hémorragie.
- Troubles gastro-intestinaux, augmentation des enzymes hépatiques, rash.
- Rare: anémie, thrombopénie.

Interactions

- Risque accru d'hémorragie en cas de prise de plusieurs antithrombotiques ou d'association du fondaparinux à d'autres médicaments présentant un risque d'hémorragie tels les AINS, ISRS et inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSN).

Précautions particulières


- Prudence chez les patients en insuffisance rénale et les patients de faible poids corporel, en raison d'un



- risque accru de saignement.
- En cas d'hémorragie grave, du plasma frais ou un concentré de facteurs de coagulation peuvent être administrés.
- Il n'est pas possible de monitorer le traitement anticoagulant.


Posol.

prévention: 2,5 mg p.j. en 1 injection

ARIXTRA (Viatris) 

fondaparinux, sodium

sol. inj. i.v./s.c. [ser. préremplie]

10 x 2,5 mg / 0,5 ml R/ b  49,53 €

(i.v.: exceptionnellement, voir RCP)

2.1.2.2.4. Protéine C

La protéine C est un dérivé du plasma humain.

Indications (synthèse du RCP)

- Hypercoagulabilité due à un déficit congénital en protéine C.

Effets indésirables

- Hémorragie.
- Réactions d'hypersensibilité.
- Comme avec tout médicament dérivé du sang, le risque de transmission d'agents infectieux ne peut être totalement exclu.

Interactions

- Risque accru d'hémorragie en cas de prise de plusieurs antithrombotiques ou d'association de la protéine C à d'autres médicaments présentant un risque d'hémorragie tels les AINS, ISRS et inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSN).

CEPROTIN (Takeda)

protéine C [plasma humain]

sol. inj. (pdr + solv.) i.v. [2x flac.]

1 x 500 UI + 5 ml solv. U.H. [847 €]

2.1.2.2.5. Antithrombine

L'antithrombine est un dérivé du plasma humain.

Indications (synthèse du RCP)

- Prévention et traitement des accidents thromboemboliques chez les patients avec un déficit congénital ou acquis en antithrombine.

Contre-indications

- Antécédents de thrombocytopenie induite par les héparines.



Effets indésirables

- Hémorragie.
- Réactions d'hypersensibilité.
- Comme avec tout médicament dérivé du sang, le risque de transmission d'agents infectieux ne peut être totalement exclu.
- Rare: thrombopénie.

Interactions

- Risque accru d'hémorragie en cas de prise de plusieurs antithrombotiques ou d'association de l'antithrombine à d'autres médicaments présentant un risque d'hémorragie tels les AINS, ISRS et inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSN).

CONCENTRÉ D'ANTITHROMBINE III BAXALTA (Takeda)

antithrombine [plasma humain]

sol. inj./perf. (pdr + solv.) i.v. [2x flac.]

1 x 500 UI + 10 ml solv. U.H. [188 €]

1 x 1.000 UI + 20 ml solv. U.H. [370 €]

(avec aiguilles et set de perfusion)

2.1.3. Thrombolytiques

Les thrombolytiques permettent de dissoudre des thrombi récents en transformant le plasminogène en plasmine qui exerce une activité fibrinolytique.

Indications (synthèse du RCP)

- Altéplase: infarctus aigu du myocarde, embolie pulmonaire, AVC ischémique.
- Ténecteplase: infarctus aigu du myocarde.
- Urokinase: embolie pulmonaire, thrombose artérielle ou veineuse.

Contre-indications

- Hémorragie active et risque accru d'hémorragie.
- Hypertension sévère non contrôlée.
- Endocardite bactérienne, péricardite.
- Rétinopathie diabétique.
- Pancréatite aiguë.
- Insuffisance hépatique sévère (RCP).
- Altéplase en cas d'AVC: également contre-indiquée en cas de convulsions, d'hyper ou hypoglycémie, d'antécédents d'AVC sévère, d'AVC récent (3 derniers mois) ou d'AVC chez les diabétiques.
- Urokinase: insuffisance rénale sévère (RCP).

Effets indésirables

- Hémorragie.
- Rarement: réactions d'hypersensibilité.

Interactions

- Risque accru d'hémorragie en cas de prise de plusieurs antithrombotiques ou d'association des thrombolytiques à d'autres médicaments présentant un risque d'hémorragie tels les AINS, ISRS et inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSN).



Altéplase

ACTILYSE (Boehringer Ingelheim)

altéplase [biosynthétique]

sol. inj./perf. (pdr + solv.) i.v. [2x flac.]

1 x 20 mg + 20 ml solv. U.H. [241 €]

1 x 50 mg + 50 ml solv. U.H. [488 €]

Ténecteplase


METALYSE (Boehringer Ingelheim)

ténecteplase [biosynthétique]

sol. inj. (pdr + solv.) i.v. [flac. + ser. préremplie]

1 x 10.000 U + 10 ml solv. U.H. [960 €]

Urokinase

ACTOSOLV (Eumedica) 

urokinase

sol. inj./perf. (pdr) i.v./i.artér. [flac.]

1 x 100.000 UI U.H. [59 €]

1 x 600.000 UI U.H. [329 €]

2.1.4. Autres antithrombotiques

Le caplacizumab est un fragment d'anticorps monoclonal humanisé (*nanobody*) qui se lie au facteur de von Willebrand et inhibe ainsi l'agrégation plaquettaire en cas de purpura thrombotique thrombocytopénique acquis.

Le défibrotide est un mélange d'oligonucléotides extraits de la muqueuse intestinale de porcs.

Indications (synthèse du RCP)

- Caplacizumab: traitement des adultes et adolescents de plus de 12 ans (avec un poids corporel de plus de 40 kg) présentant un épisode de purpura thrombotique thrombocytopénique acquis (PTTa).
- Défibrotide: traitement de la maladie veino-occlusive hépatique sévère dans le cadre de la transplantation de cellules souches hématopoïétiques.

Contre-indications

- Défibrotide: utilisation concomitante d'un traitement thrombolytique.

Effets indésirables

- Caplacizumab: saignements, céphalées, urticaire, fatigue, fièvre.
- Défibrotide: hémorragie, hypotension, vomissements.

Interactions

- Caplacizumab: risque accru d'hémorragie lors de la prise concomitante d'anticoagulants, d'héparine à haute dose ou d'antiplaquettaires.
- Défibrotide: risque accru d'hémorragie en cas de prise de plusieurs antithrombotiques ou d'association à d'autres médicaments présentant un risque d'hémorragie tels les AINS, ISRS et inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSN).



CABLIVI (Ablynx)

caplacizumab [biosynthétique]

sol. inj. (pdr + solv.) i.v./s.c. [flac. + ser. préremplie]

1 x 10 mg + 1 ml solv. U.H. [3.635 €]

(médicament orphelin)

DEFITELIO (Jazz Pharmaceuticals)

défibrotide

sol. perf. à diluer i.v. [flac.]

10 x 200 mg / 2,5 ml U.H. [4.516 €]

(médicament orphelin)

2.2. Antihémorragiques

Ce chapitre reprend successivement:

- les facteurs de coagulation et anticorps monoclonaux
- les antifibrinolytiques
- l'étamsylate
- les préparations à usage local.

Les autres produits utilisés dans le cadre d'hémorragies sont les suivants.

- Protamine: antidote des héparines (*voir 2.1.2.2.1. et 20.1.1.2.*).

- Vitamine K: antidote des antagonistes de la vitamine K (*voir 2.1.2.1.1. et 14.2.1.4.*).

- Idarucizumab: anticorps monoclonal utilisé comme antidote du dabigatran (*voir 20.1.1.4. et Folia de mai 2016.*).

- Andexanet alfa: un facteur Xa de coagulation recombinant et inactivé, utilisé comme antidote de l'apixaban et du rivaroxaban (*voir 20.1.1.5.*).

- Desmopressine (*voir 5.5.2.*), un analogue de l'hormone antidiurétique: antihémorragique en cas de dysfonctionnement plaquettaire, dans les formes mineures d'hémophilie A (hémophilie classique) ou dans la maladie de von Willebrand, souvent en association à un antifibrinolytique. Elle est utilisée en outre comme hémostatique chez des patients cirrhotiques et urémiques ou après chirurgie cardio-pulmonaire.

- Somatostatine (*voir 5.5.5.*): traitement des hémorragies gastro-intestinales secondaires à un ulcère ou à une gastrite érosive.

2.2.1. Facteurs de coagulation et anticorps monoclonaux

Les facteurs de coagulation ou concentrés de complexe prothrombinique sont indiqués en cas d'hémorragies liées à un déficit en facteur de coagulation. Ils sont préparés à partir de plasma humain (dérivés du plasma) ou produits par la technologie recombinante. Lors de la préparation de dérivés du plasma, on fait appel à des méthodes d'inactivation virale, comme p.ex. le solvant/détergent, le traitement par la chaleur ou la nanofiltration.

Les facteurs de coagulation biosynthétiques VII, VIII et IX sont appelés respectivement eptacog alfa, octocog alfa et nonacog alfa. Le damoctocog alfa pégol, l'efmorocog alfa, le lonocog alfa, le morocog alfa, le simocog alfa, le turocog alfa et le susocog alfa sont des analogues biosynthétiques du facteur VIII. L'albutrépénonacog alfa, l'eftrénonacog alfa, le nonacog bêta pegol et le nonacog gamma sont des analogues biosynthétiques du facteur IX.

L'émicizumab est un anticorps monoclonal humanisé se liant aux facteurs IX activé et X pour compenser le déficit en facteur VIII de l'hémophilie A. L'émicizumab mime l'activité du facteur VIII.

Indications (synthèse du RCP)

- Traitement et prophylaxie des hémorragies liées à un déficit congénital en facteurs de coagulation ou (pour certains produits) à un déficit acquis en facteurs de coagulation.



- Facteur de coagulation VII activé (eptacog alfa): aussi traitement des hémorragies du post-partum sévères lorsque les utérotoniques sont insuffisants pour obtenir une réponse hémostatique.

Contre-indications

- Facteur IX: coagulation intravasculaire disséminée (CIVD).
- Concentré de complexe prothrombinique: angor, antécédents de thrombopénie induite par l'héparine.
- Facteurs de coagulation activés: coagulation intravasculaire disséminée (CIVD), affections hépatiques sévères, infarctus du myocarde, thrombose aiguë et/ou embolie.

Effets indésirables

- Risque de réactions d'hypersensibilité parfois graves.
- Le risque de transmission d'agents infectieux ne peut être totalement exclu avec les dérivés du sang.
- Risque d'apparition d'anticorps neutralisants.
- Emicizumab: arthralgies, céphalées, diarrhée, myalgie et pyrexie; microangiopathie thrombotique et thromboembolie.

Grossesse et allaitement

- Emicizumab: les femmes en âge de procréer doivent recevoir une contraception efficace jusqu'à 6 mois après l'arrêt du traitement.

Facteur VIII ou antihémophilique A et anticorps monoclonaux utilisés dans l'hémophilie A

ADVATE (Takeda) octocog alfa [biosynthétique] sol. inj. (pdr + solv.) i.v. [2x flac., Baxject III]	ADYNOVI (Abacus) rurioctocog alfa, pégol [biosynthétique] sol. inj. (pdr + solv.) i.v. [2x flac., Baxject III]	250 UI + 3 ml solv. R/ a [†] ○ 199,76 €
250 UI + 2 ml solv. R/ a [†] ○ 162,23 €	1.000 UI + 2 ml solv. R/ a [†] ○ 876,38 €	500 UI + 3 ml solv. R/ a [†] ○ 388,94 €
500 UI + 2 ml solv. R/ a [†] ○ 313,88 €	2.000 UI + 5 ml solv. R/ a [†] ○ 1.627,87 €	1.000 UI + 3 ml solv. R/ a [†] ○ 767,32 €
1.000 UI + 2 ml solv. R/ a [†] ○ 617,20 €	(distribution parallèle)	1.500 UI + 3 ml solv. R/ a [†] ○ 1.145,68 €
1.500 UI + 2 ml solv. R/ a [†] ○ 1.002,28 €	AFSTYLA (CSL Behring) lonococog alfa [biosynthétique] sol. inj. (pdr + solv.) i.v. [2x flac.]	2.000 UI + 3 ml solv. R/ a [†] ○ 1.524,07 €
2.000 UI + 5 ml solv. R/ a [†] ○ 1.267,96 €	250 UI + 2,5 ml solv. R/ a [†] ○ 182,78 €	3.000 UI + 3 ml solv. R/ a [†] ○ 2.280,80 €
3.000 UI + 5 ml solv. R/ a [†] ○ 1.951,38 €	500 UI + 2,5 ml solv. R/ a [†] ○ 354,99 €	ELOCTA (Orifarm Belgium) efmorococog alfa [biosynthétique] sol. inj. (pdr + solv.) i.v. [flac. + ser. préremplie]
ADYNOVI (Takeda) rurioctocog alfa, pégol [biosynthétique] sol. inj. (pdr + solv.) i.v. [2x flac., Baxject III]	1.000 UI + 2,5 ml solv. R/ a [†] ○ 699,41 €	3.000 UI + 3 ml solv. R/ a [†] ○ 2.280,80 €
500 UI + 2 ml solv. R/ a [†] ○ 446,19 €	2.000 UI + 5 ml solv. R/ a [†] ○ 1.388,23 €	(distribution parallèle)
1.000 UI + 2 ml solv. R/ a [†] ○ 876,38 €	3.000 UI + 5 ml solv. R/ a [†] ○ 2.077,07 €	ESPEROCT (Novo Nordisk) turoctocog alfa, pégol [biosynthétique] sol. inj. (pdr + solv.) i.v. [flac. + ser. préremplie]
2.000 UI + 5 ml solv. R/ a [†] ○ 1.627,87 €	ELOCTA (Swedish Orphan) efmorococog alfa [biosynthétique] sol. inj. (pdr + solv.) i.v. [flac. + ser. préremplie]	500 UI + 4 ml solv. R/ a [†] ○ 388,94 €



- 1.000 UI + 4 ml solv. R/ a † ○ 767,32 €
- 1.500 UI + 4 ml solv. R/ a † ○ 1.145,68 €
- 2.000 UI + 4 ml solv. R/ a † ○ 1.524,07 €
- 3.000 UI + 4 ml solv. R/ a † ○ 2.280,80 €

ESPEROCT (Abacus)

turoctocog alfa, pégol [biosynthétique]
sol. inj. (pdr + solv.) i.v. [flac. + ser. préremplie]

- 500 UI + 4 ml solv. R/ a † ○ 388,94 €
- 1.000 UI + 4 ml solv. R/ a † ○ 767,32 €

(distribution parallèle)

FACTANE (C.A.F. - D.C.F.)

facteur VIII [plasma humain]
sol. inj. (pdr + solv.) i.v. [2x flac.]

- 1.000 UI + 5 ml solv. R/ a † ○ 720,46 €
- 2.000 UI + 10 ml solv. R/ a † ○ 1.430,35 €

HEMLIBRA (Roche)

émicizumab [biosynthétique]
sol. inj. s.c. [flac.]

- 1 x 30 mg / 1 ml R/ a † ○ 2.295,22 €
- 1 x 60 mg / 0,4 ml R/ a † ○ 4.579,86 €
- 1 x 105 mg / 0,7 ml R/ a † ○ 8.006,82 €
- 1 x 150 mg / 1 ml R/ a † ○ 11.433,77 €

HEMLIBRA (Abacus)

émicizumab [biosynthétique]
sol. inj. s.c. [flac.]

1 x 60 mg / 0,4 ml R/
(distribution parallèle)

JIVI (Bayer)

damoctocog alfa, pégol
[biosynthétique]
sol. inj. (pdr + solv.) i.v. [flac. + ser. préremplie]

- 1 x 500 UI + 2,5 ml solv. R/ a † ○ 388,94 €
- 1 x 1.000 UI + 2,5 ml solv. R/ a † ○ 767,32 €
- 1 x 2.000 UI + 2,5 ml solv. R/ a † ○ 1.524,07 €
- 1 x 3.000 UI + 2,5 ml solv. R/ a † ○ 2.280,80 €

KOVALTRY (Bayer)

octocog alfa [biosynthétique]
sol. inj. (pdr + solv.) i.v. [flac. + ser. préremplie]

- 500 UI + 2,5 ml solv. R/ a † ○ 334,75 €
- 1.000 UI + 2,5 ml solv. R/ a † ○ 658,90 €
- 2.000 UI + 5 ml solv. R/ a † ○ 1.267,96 €
- 3.000 UI + 5 ml solv. R/ a † ○ 1.951,38 €

NOVOEIGHT (Novo Nordisk)

turoctocog alfa [biosynthétique]
sol. inj. (pdr + solv.) i.v. [flac. + ser. préremplie]

- 250 UI + 4 ml solv. R/ a † ○ 177,94 €
- 500 UI + 4 ml solv. R/ a † ○ 345,28 €
- 1.000 UI + 4 ml solv. R/ a † ○ 680,00 €
- 1.500 UI + 4 ml solv. R/ a † ○ 1.014,72 €
- 2.000 UI + 4 ml solv. R/ a † ○ 1.349,43 €
- 3.000 UI + 4 ml solv. R/ a † ○ 2.018,84 €

NUWIQ (Octapharma)

simoctocog alfa [biosynthétique]
sol. inj. (pdr + solv.) i.v. [flac. + ser. préremplie]

- 250 UI + 2,5 ml solv. R/ a † ○ 177,94 €
- 500 UI + 2,5 ml solv. R/ a † ○ 345,28 €
- 1.000 UI + 2,5 ml solv. R/ a † ○ 680,00 €
- 2.000 UI + 2,5 ml solv. R/ a † ○ 1.349,43 €

OBIZUR (Takeda)

susoctocog alfa [biosynthétique]
sol. inj. (pdr + solv.) i.v. [flac. + ser. préremplie]

500 UI + 1 ml solv. U.H. [1.076 €]
(uniquement en cas d'hémophilie acquise)

OCTANATE (Octapharma)

facteur VIII [plasma humain]
sol. inj./perf. (pdr + solv.) i.v. [2x flac.]

- 250 UI + 5 ml solv. R/ a † ○ 162,23 €
- 500 UI + 5 ml solv. R/ a † ○ 313,88 €
- 1.000 UI + 5 ml solv. R/ a † ○ 617,20 €

REFACTO AF (Pfizer)

moroctocog alfa [biosynthétique]
sol. inj. (pdr + solv.) i.v. [ser. préremplie]

- 250 UI + 4 ml solv. R/ a † ○ 182,78 €
- 500 UI + 4 ml solv. R/ a † ○ 354,99 €
- 1.000 UI + 4 ml solv. R/ a † ○ 699,41 €
- 2.000 UI + 4 ml solv. R/ a † ○ 1.388,23 €
- 3.000 UI + 4 ml solv. R/ a † ○ 2.077,07 €

Facteur von Willebrand

WILFACTIN (C.A.F. - D.C.F.)

facteur von Willebrand [plasma humain]
sol. inj. (pdr + solv.) i.v. [2x flac.]

- 1.000 UI + 10 ml solv. R/ a † ○ 899,22 €



Facteur VIII + facteur von Willebrand

HAEMATE P (CSL Behring)

facteur VIII [plasma humain] 500 UI
 facteur von Willebrand [plasma humain] 1.200 UI
 sol. inj./perf. (pdr + solv.) i.v. [2x flac.]
 R/ a † ○ 517,45 €

facteur VIII [plasma humain] 1.000 UI
 facteur von Willebrand [plasma humain] 2.400 UI
 sol. inj./perf. (pdr + solv.) i.v. [2x flac.]
 R/ a † ○ 1.019,29 €
 (aussi en cas d'hémophilie acquise)

WILATE (Octapharma)

facteur VIII [plasma humain] 500 UI
 facteur von Willebrand [plasma humain] 500 UI
 sol. inj./perf. (pdr + solv.) i.v. [2x flac.]
 R/ a † ○ 345,80 €

facteur VIII [plasma humain] 1.000 UI
 facteur von Willebrand [plasma humain] 1.000 UI
 sol. inj./perf. (pdr + solv.) i.v. [2x flac.]
 R/ a † ○ 681,03 €

Facteur IX ou antihémophilique B

ALPROLIX (Swedish Orphan)

eftrénonacog alfa [biosynthétique]
 sol. inj. (pdr + solv.) i.v. [flac. + ser.
 préremplie]

250 UI + 5 ml solv. R/ a † ○
 311,83 €

500 UI + 5 ml solv. R/ a † ○
 613,10 €

1.000 UI + 5 ml solv. R/ a † ○
 1.215,64 €

2.000 UI + 5 ml solv. R/ a † ○
 2.420,70 €

3.000 UI + 5 ml solv. R/ a † ○
 3.625,76 €

(médicament orphelin)

BENEFIX (Pfizer)

nonacog alfa [biosynthétique]
 sol. perf. (pdr + solv.) i.v. [flac. + ser.
 préremplie]

500 UI + 5 ml solv. R/ a † ○
 311,56 €

1.000 UI + 5 ml solv. R/ a † ○
 612,52 €

2.000 UI + 5 ml solv. R/ a † ○
 1.214,47 €

IDELVION (CSL Behring)

albutrénénonacog alfa [biosynthétique]
 sol. inj. (pdr + solv.) i.v. [2x flac.]

250 UI + 2,5 ml solv. R/ a † ○
 490,82 €

500 UI + 2,5 ml solv. R/ a † ○
 971,04 €

1.000 UI + 2,5 ml solv. R/ a † ○
 1.931,53 €

2.000 UI + 5 ml solv. R/ a † ○
 3.852,51 €

3.500 UI + 5 ml solv. R/ a † ○
 6.733,95 €

(médicament orphelin)

OCTANINE (Octapharma)

facteur IX [plasma humain]
 sol. inj. (pdr + solv.) i.v. [2x flac.]

500 UI + 5 ml solv. R/ a † ○
 223,99 €

1.000 UI + 10 ml solv. R/ a † ○
 437,44 €

REFIXIA (Novo Nordisk)

nonacog bêta, pégol [biosynthétique]
 sol. inj. (pdr + solv.) i.v. [flac. + ser.
 préremplie]

500 UI + 4 ml solv. R/ a † ○
 735,25 €

1.000 UI + 4 ml solv. R/ a † ○
 1.459,73 €

2.000 UI + 4 ml solv. R/ a † ○
 2.908,87 €

RIXUBIS (Takeda)

nonacog gamma [biosynthétique]
 sol. inj. (pdr + solv.) i.v. [2x flac.]

250 UI + 5 ml solv. R/ a † ○
 161,07 €

500 UI + 5 ml solv. R/ a † ○
 311,56 €

1.000 UI + 5 ml solv. R/ a † ○
 612,52 €

2.000 UI + 5 ml solv. R/ a † ○
 1.214,48 €



Facteur XIII

CLUVOT (CSL Behring)

facteur XIII [plasma humain]
sol. inj./perf. (pdr + solv.) i.v. [2x flac.]
250 UI + 4 ml solv. U.H. [122 €]

Concentré de complexe prothrombinique

COFACT (C.A.F. - D.C.F.)

facteur II [plasma humain] 140 UI
facteur VII [plasma humain] 70 UI
facteur IX [plasma humain] 250 UI
facteur X [plasma humain] 140 UI
protéine C [plasma humain] 111 UI
protéine S [plasma humain] 10 UI
sol. inj. (pdr + solv.) i.v. [2x flac.]
126 €

facteur II [plasma humain] 280 UI
facteur VII [plasma humain] 140 UI
facteur IX [plasma humain] 500 UI
facteur X [plasma humain] 280 UI
protéine C [plasma humain] 222 UI
protéine S [plasma humain] 20 UI

sol. inj. (pdr + solv.) i.v. [2x flac.]
239 €

CONFIDEX (CSL Behring)

facteur II [plasma humain] 400 UI
facteur VII [plasma humain] 200 UI
facteur IX [plasma humain] 400 UI
facteur X [plasma humain] 440 UI
protéine C [plasma humain] 300 UI
protéine S [plasma humain] 240 UI
sol. inj. (pdr + solv.) i.v. [2x flac.]
239 €

OCTAPLEX (Octapharma)

facteur II [plasma humain] 280 UI

facteur VII [plasma humain] 180 UI
facteur IX [plasma humain] 500 UI
facteur X [plasma humain] 360 UI
protéine C [plasma humain] 260 UI
protéine S [plasma humain] 240 UI
sol. inj. (pdr + solv.) i.v. [2x flac.]
239 €

facteur II [plasma humain] 560 UI
facteur VII [plasma humain] 360 UI
facteur IX [plasma humain] 1.000 UI
facteur X [plasma humain] 720 UI
protéine C [plasma humain] 520 UI
protéine S [plasma humain] 480 UI
sol. inj. (pdr + solv.) i.v. [2x flac.]
467 €

Facteurs de coagulation activés

FEIBA (Takeda)

FEIBA [Factor Eight Inhibitor Bypassing Activity, contenant les facteurs activés du complexe prothrombinique, plasma humain]
sol. inj./perf. (pdr + solv.) i.v. [2x flac.]
1.000 U + 20 ml solv. U.H. [713 €]
(principalement facteur VIIa; aussi en cas d'hémophilie acquise)

NOVOSEVEN (Novo Nordisk)

eptacog alfa [activé, biosynthétique]
sol. inj. (pdr + solv.) i.v. [flac. + ser. préremplie]
50.000 UI + 1 ml solv. U.H. [471 €]
100.000 UI + 2 ml solv. U.H. [943 €]
250.000 UI + 5 ml solv. U.H. [2.357 €]
(aussi en cas d'hémophilie acquise)

Fibrinogène

FIBCLLOT (LFB)

fibrinogène [plasma humain]
sol. inj./perf. (pdr + solv.) i.v. [2x flac.]
1,5 g + 100 ml solv. U.H. [618 €]

FIBRYGA (Octapharma)

fibrinogène [plasma humain]
sol. inj./perf. (pdr + solv.) i.v. [2x flac.]
1 g + 50 ml solv. U.H. [412 €]

RIASTAP (CSL Behring)

fibrinogène [plasma humain]
sol. inj./perf. (pdr) i.v. [flac.]
1 x 1 g U.H. [412 €]

2.2.2. Antifibrinolytiques

Positionnement

- Toute utilisation d'antifibrinolytiques en prévention d'hémorragies nécessite une évaluation du rapport



bénéfice/risque. Après une chirurgie non cardiaque, des données d'études montrent une réduction significative du nombre d'hémorragies majeures après l'administration prophylactique d'acide tranexamique, sans augmentation des effets indésirables cardio-vasculaires.

- Il n'existe pas de données probantes justifiant une administration en continu.

Indications (synthèse du RCP)

- Acide tranexamique: ménorragies (p.ex. à la suite de la mise en place d'un DIU au cuivre), certains types d'interventions chirurgicales (oto-rhino-laryngologique, gynécologique, urologique, thoracique et abdominale, dentaire).
- Aprotinine: prévention des hémorragies lors d'un pontage aorto-coronarien chez des patients à haut risque d'hémorragie.

Contre-indications

- Thromboembolie artérielle ou veineuse.
- Antécédents de convulsions.
- Acide tranexamique: insuffisance rénale sévère.

Effets indésirables

- Thrombose artérielle ou veineuse susceptible de survenir dans n'importe quel site.
- Acide tranexamique: insuffisance rénale aiguë, effets indésirables gastro-intestinaux; rare: troubles visuels et altération de la vision des couleurs.
- Aprotinine: choc anaphylactique, insuffisance rénale aiguë et aggravation d'une atteinte rénale préexistante, thrombose, ischémie.

Interactions

- Risque accru de thrombose en association avec des médicaments augmentant le risque thrombo-embolique (p.ex. les estrogènes).


Précautions particulières

- Prudence chez les patients à risque accru de thrombose.
- En cas de saignement au niveau des voies urinaires, il existe un risque de formation d'un thrombus avec occlusion.

Acide tranexamique


Posol.per os


: 2 à 4,5 g p.j. en 1 à plusieurs prises

EXACYL (Eurocept) 

acide tranexamique

compr. pellic.

100 x 250 mg R/ b  20,45 €

20 x 500 mg R/ b  13,67 €

sol. (unidose)

10 x 1 g / 10 ml R/ b  14,16 €

sol. inj. i.v. [amp.]

6 x 500 mg / 5 ml R/ b  12,79 €



Aprotinine

TRASYLOL (Nordic Pharma)

aprotinine

sol. inj./perf. i.v. [flac.]

1 x 500.000 UIK / 50 ml U.H. [74 €]

2.2.3. Étamsylate

Positionnement

- L'étamsylate, un hémostatique aspécifique, est utilisé sans beaucoup d'arguments dans des hémorragies sans origine précise. En présence d'une hémorragie, il faut d'abord chercher à en découvrir l'origine.

Effets indésirables

- Céphalées, rash, hyperthermie.
- Administration orale: aussi troubles gastro-intestinaux.
- Administration intraveineuse: aussi hypotension.

DICYNONE (Omedicamed)

étamsylate

compr.

20 x 250 mg R/ 11,85 €

2.2.4. Préparations à usage local

Positionnement

- Ces préparations sont proposées pour favoriser l'hémostase et la cicatrisation, p.ex. lors d'interventions chirurgicales. On ne dispose pas de preuves d'efficacité sur des critères d'évaluation cliniques.

Effets indésirables

- Risque de transmission d'infections avec les dérivés du sang.

ARTISS (Baxter)

composant I

aprotinine 3.000 UIK / 1 ml

fibrinogène [plasma humain] 91 mg / 1 ml

colle (sol.) [ser. préremplie] (I)

composant II

calcium, chlorure 4,44 mg / 1 ml

thrombine [plasma humain] 4 UI / 1 ml

colle (sol.) [ser. préremplie] (II)

2 ml R/ 126,98 € (I+II)

4 ml R/ 223,67 € (I+II)

(solutions congelées)

TACHOSIL (Corza)

fibrinogène [plasma humain] 5,5 mg / 1 cm²

thrombine [plasma humain] 2 UI / 1 cm²

éponge médic. épilés.

1 x (3 x 2,5 cm) 42 €

2 x (4,8 x 4,8 cm) 243 €

1 x (9,5 x 4,8 cm) 221 €

TISSEEL S/D (Baxter)

composant I

aprotinine 3.000 UIK / 1 ml

fibrinogène [plasma humain] 72 mg / 1 ml

facteur XIII [plasma humain] 0,6 UI / 1 ml

colle (sol.) [ser. préremplie] (I)

composant II

calcium, chlorure 4,44 mg / 1 ml

thrombine [plasma humain] 500 UI / 1 ml

colle (sol.) [ser. préremplie] (II)

2 ml 130 € (I+II)

4 ml 242 € (I+II)

10 ml 561 € (I+II)

(solutions congelées)



2.3. Médicaments de l'hématopoïèse

Ce chapitre reprend successivement:

- les médicaments de l'anémie
- les médicaments de la thrombopénie
- les médicaments de la neutropénie et dans la mobilisation des cellules souches.

2.3.1. Médicaments de l'anémie

L'anémie peut être causée par une diminution de la production ou une augmentation de la destruction des érythrocytes, ou par une perte de sang.

Le fer (*voir 14.1.1.*) est nécessaire à la synthèse de l'hémoglobine et est utilisé dans le traitement de l'anémie ferriprive.

La vitamine B (*voir 14.2.2.5.*) et l'acide folique (*voir 14.2.2.6.*) sont nécessaires à la production entre autres des globules rouges et sont utilisés en cas de déficit en vitamine B ou en acide folique, et dans le traitement de l'anémie pernicieuse.

2.3.1.1. Epoétines

- L'érythropoïétine stimule la production des globules rouges.
- Les époétines (érythropoïétines biosynthétiques) sont identiques à l'érythropoïétine humaine.
- La darbépoétine et l'époétine bêta sont des analogues de l'érythropoïétine qui doivent être administrés moins fréquemment que l'érythropoïétine.

Positionnement

- Les époétines sont prescrites à des patients présentant une anémie consécutive à une insuffisance rénale chronique ou à une chimiothérapie dans le but de diminuer la nécessité de transfusion sanguine et/ou d'améliorer la qualité de vie.
- Dans l'anémie associée à un cancer, l'administration d'époétine n'améliore pas la survie.

Indications (synthèse du RCP)

- Anémie due à l'insuffisance rénale chronique.
- Transfusion sanguine autologue, anémie chez des prématurés ou dans le cadre d'une chimiothérapie.

Contre-indications

- Aplasie érythrocytaire pure (*pure red cell anemia*) après un traitement par des époétines.
- Hypertension non contrôlée.

Effets indésirables

- *Voir Folia de février 2008.*
- Asthénie, symptômes grippaux.
- Douleurs ostéoarticulaires.
- Troubles gastro-intestinaux.
- Céphalées.
- Hypertension.
- Hyperkaliémie.
- Thrombose, surtout avec des doses visant à atteindre un taux d'hémoglobine supérieur à 12 g/dl.
- Rash (rarement syndrome de Stevens-Johnson et Nécrolyse Epidermique Toxique).
- Suspicion d'une progression de certaines affections malignes lors de l'usage dans le cadre d'une anémie consécutive à une chimiothérapie.
- Rarement: aplasie érythrocytaire pure (*pure red cell anemia*) chez des patients atteints d'une insuffisance rénale chronique.



ARANESP (Amgen) darbépoétine alfa [biosynthétique] sol. inj. i.v./s.c. [ser. préremplie]	1 x 40.000 UI / 1 ml U.H. [190 €]	1 x 150 µg / 0,3 ml U.H. [231 €] 1 x 200 µg / 0,3 ml U.H. [307 €] 1 x 250 µg / 0,3 ml U.H. [384 €]
4 x 10 µg / 0,4 ml U.H. [76 €] 4 x 20 µg / 0,5 ml U.H. [151 €] 4 x 30 µg / 0,3 ml U.H. [238 €] 4 x 40 µg / 0,4 ml U.H. [303 €] 4 x 50 µg / 0,5 ml U.H. [396 €] 4 x 60 µg / 0,3 ml U.H. [476 €] 4 x 80 µg / 0,4 ml U.H. [634 €] 4 x 100 µg / 0,5 ml U.H. [770 €] 4 x 150 µg / 0,3 ml U.H. [1.094 €] 1 x 300 µg / 0,6 ml U.H. [541 €] 1 x 500 µg / 1 ml U.H. [867 €]	EPREX (Janssen-Cilag) époétine alfa [biosynthétique] sol. inj. i.v./s.c. [ser. préremplie]	NEORECORMON (Roche) époétine bêta [biosynthétique] sol. inj. i.v./s.c. [ser. préremplie]
ARANESP (Amgen) darbépoétine alfa [biosynthétique] sol. inj. s.c. SureClick [stylo prérempli]	6 x 1.000 UI / 0,5 ml U.H. [43 €] 6 x 2.000 UI / 0,5 ml U.H. [86 €] 6 x 3.000 UI / 0,3 ml U.H. [130 €] 6 x 4.000 UI / 0,4 ml U.H. [173 €] 6 x 5.000 UI / 0,5 ml U.H. [216 €] 6 x 6.000 UI / 0,6 ml U.H. [260 €] 6 x 8.000 UI / 0,8 ml U.H. [346 €] 6 x 10.000 UI / 1 ml U.H. [433 €] 6 x 20.000 UI / 0,5 ml U.H. [865 €] 6 x 40.000 UI / 1 ml U.H. [1.478 €]	6 x 500 UI / 0,3 ml U.H. [25 €] 6 x 2.000 UI / 0,3 ml U.H. [100 €] 6 x 3.000 UI / 0,3 ml U.H. [149 €] 6 x 4.000 UI / 0,3 ml U.H. [190 €] 6 x 5.000 UI / 0,3 ml U.H. [238 €] 6 x 6.000 UI / 0,3 ml U.H. [285 €] 6 x 10.000 UI / 0,6 ml U.H. [475 €] 4 x 30.000 UI / 0,6 ml U.H. [951 €]
1 x 150 µg / 0,3 ml U.H. [280 €] 1 x 300 µg / 0,6 ml U.H. [541 €] 1 x 500 µg / 1 ml U.H. [867 €]	MIRCERA (Roche) (méthoxypropyléthylène glycol)époétine bêta [biosynthétique] sol. inj. i.v./s.c. [ser. préremplie]	NEORECORMON (Abacus) époétine bêta [biosynthétique] sol. inj. i.v./s.c. [ser. préremplie]
BINOCRIT (Sandoz) époétine alfa [biosynthétique] sol. inj. i.v./s.c. [ser. préremplie]	1 x 50 µg / 0,3 ml U.H. [77 €] 1 x 75 µg / 0,3 ml U.H. [115 €] 1 x 100 µg / 0,3 ml U.H. [154 €]	6 x 5.000 UI / 0,3 ml U.H. [238 €] 6 x 10.000 UI / 0,6 ml U.H. [] (distribution parallèle)
6 x 2.000 UI / 1 ml U.H. [77 €] 6 x 4.000 UI / 0,4 ml U.H. [146 €] 6 x 10.000 UI / 1 ml U.H. [365 €]		

2.3.1.2. Roxadustat

En cas d'hypoxie, le facteur induit par l'hypoxie (HIF) stimule la production de globules rouges et d'hémoglobine. La propyl hydroxylase est une enzyme qui intervient dans sa dégradation. Le roxadustat inhibe cette enzyme, ce qui doit avoir pour effet d'augmenter l'HIF.

Positionnement

- Dans le traitement de l'anémie symptomatique liée à la maladie rénale chronique, l'efficacité du roxadustat est similaire à celle des époétines. L'utilisation du roxadustat semble néanmoins exposer à un surcroît de mortalité, d'événements thrombotiques et d'infections, ce qui rend la balance bénéfice-risque du roxadustat plutôt défavorable (*voir Folia de janvier 2024*).

Indications (synthèse du RCP)

- Anémie symptomatique liée à la maladie rénale chronique.

Contre-indications

- Troisième trimestre de la **grossesse, allaitement**.
- Allergie à l'arachide ou au soja.



Effets indésirables

- Hypertension.
- Hyperkaliémie.
- Thrombose de l'accès vasculaire pour dialyse, thrombose veineuse profonde.
- Troubles gastro-intestinaux.
- Céphalées, convulsions.
- Sepsis.
- Oedème périphérique.

Grossesse et allaitement

- Grossesse:
 - Le roxadustat est contre-indiqué pendant le troisième trimestre de la grossesse (sur base du RCP).
 - Une contraception efficace doit être utilisée pendant le traitement jusqu'à une semaine après l'arrêt.
- Allaitement:
 - Le roxadustat est contre-indiqué pendant l'allaitement (sur base du RCP).

Interactions

- Le roxadustat doit être pris au moins 1h après l'administration de chélateurs du phosphate ou de compléments contenant du calcium, du fer, du magnésium ou de l'aluminium).
- Le roxadustat est un substrat du CYP2C8 (voir Tableau Ic. dans Intro.6.3.).
- Le roxadustat est un inhibiteur de l'OATP1B1 et peut alors augmenter les concentrations plasmatiques (et les effets indésirables) des statines.

Précautions particulières






- L'utilisation de roxadustat est déconseillée en cas d'insuffisance hépatique sévère.

Administration et posologie

- Le schéma posologique compliqué (prise à 3 jours non consécutifs par semaine) expose à un risque d'erreur.

EVRENZO (Astellas)

roxadustat
compr. pellic.

- 12 x 20 mg R/ a †  51,76 €
- 12 x 50 mg R/ a †  116,26 €
- 12 x 70 mg R/ a †  158,54 €
- 12 x 100 mg R/ a †  221,95 €
- 12 x 150 mg R/ a †  327,65 €

2.3.1.3. Luspatercept

Le luspatercept est une protéine de fusion recombinante entraînant une maturation érythroïde.

Indications (synthèse du RCP)

- Certaines anémies dépendantes de la transfusion, dues à un syndrome myélodysplasique.
- Anémie associée à une bêta-thalassémie.



Contre-indications

- **Grossesse.**

Effets indésirables

- Asthénie, douleurs musculaires, douleurs articulaires.
- Vertiges, céphalées.
- Hypertension.
- Thromboembolie.
- Troubles gastro-intestinaux.
- Infections (des voies urinaires et des voies aériennes supérieures).

REBLOZYL (Bristol-Myers Squibb)

luspatercept [biosynthétique]

sol. inj. (pdr) s.c. [flac.]

1 x 25 mg U.H. [1.567 €]

1 x 75 mg U.H. [4.699 €]

(médicament orphelin)

REBLOZYL (Abacus)

luspatercept [biosynthétique]

sol. inj. (pdr) s.c. [flac.]

1 x 25 mg U.H. []

(médicament orphelin; distribution parallèle)

2.3.2. Médicaments de la thrombopénie

L'avatrombopag, l'eltrombopag et le romiplostim sont des agonistes du récepteur de la thrombopoïétine, une hormone stimulant la production de plaquettes dans le sang.

Indications (synthèse du RCP)

- Thrombopénie immune résistant aux autres traitements (corticostéroïdes, immunoglobulines).
- Avatrombopag: aussi thrombocytopénie sévère associée à une maladie hépatique chronique, en prévision d'une procédure invasive.
- Eltrombopag: aussi thrombocytopénie en cas d'hépatite C chronique, anémie aplastique sévère réfractaire aux autres traitements.

Effets indésirables

- Augmentation de la numération plaquettaire, rarement thromboembolie.
- Hémorragie à l'arrêt du traitement.
- Réactions d'hypersensibilité.
- Eltrombopag: aussi élévation des enzymes hépatiques (réversible).
- Romiplostim: aussi infections respiratoires.

Interactions

- L'avatrombopag est un substrat du CYP3A4 et du CYP2C9 (voir *Tableau Ic. dans Intro.6.3.*).

Avatrombopag

DOPTELET (Swedish Orphan)



avatrombopag (maléate)

compr. pellic.

10 x 20 mg U.H. [673 €]

15 x 20 mg U.H. [1.049 €]

30 x 20 mg U.H. [2.098 €]

Eltrombopag

REVOLADE (Novartis Pharma)

eltrombopag (olamine)

compr. pellic.

28 x 25 mg U.H. [766 €]

28 x 50 mg U.H. [1.531 €]

Romiplostim

NPLATE (Amgen)

romiplostim [biosynthétique]

sol. inj. (pdr) s.c. [flac.]

1 x 125 µg U.H. [273 €]

sol. inj. (pdr + solv.) s.c. [flac. + ser. préremplie]

1 x 250 µg + 0,72 ml solv. U.H. [467 €]

1 x 500 µg + 1,2 ml solv. U.H. [934 €]

2.3.3. Médicaments dans la neutropénie et la mobilisation des cellules souches

Il s'agit des *Granulocyte colony-stimulating factors* (G-CSF), et du plérixafor qui est un inhibiteur des molécules d'adhésion des cellules souches.

Positionnement

- Les G-CSF sont utilisés pour combattre la neutropénie induite par un traitement cytostatique ou immunosuppresseur, mais aussi dans certains cas de neutropénie idiopathique ou congénitale. L'objectif est entre autres de limiter le risque et la durée des infections en augmentant le nombre de neutrophiles.
- Ils sont aussi utilisés pour la mobilisation des cellules souches hématopoïétiques en vue d'une collecte pour la transplantation de moelle osseuse.
- Le plérixafor est utilisé, en association avec des G-CSF, pour la mobilisation des cellules souches du sang périphérique en cas d'autogreffe de moelle osseuse.

Effets indésirables

- Douleurs musculo-squelettiques, dysurie, céphalées, thrombopénie, anémie, troubles pulmonaires, hémoptysie.
- Rarement: réactions d'hypersensibilité.

Administration et posologie

- Le lipegfilgrastim et le pegfilgrastim sont des formes de filgrastim à longue durée d'action qui ne nécessitent qu'une seule injection par cure de chimiothérapie.

Filgrastim

ACCOFIL (Accord)

filgrastim [biosynthétique]

sol. inj./perf. à diluer i.v./s.c. [ser. préremplie]

1 x 12 MU / 0,2 ml (0,12 mg/0,2 ml) R/ a ! Ⓞ 26,58 €



5 x 30 MU / 0,5 ml (0,3 mg/0,5 ml)
R/a ! € 225,21 €
5 x 48 MU / 0,5 ml (0,48 mg/0,5 ml)
R/a ! € 314,25 €
1 x 70 MU / 0,73 ml (0,7 mg/0,73 ml)
R/a ! € 98,88 €

NEUPOGEN (Amgen)
filgrastim [biosynthétique]

sol. inj./perf. à diluer i.v./s.c. [flac.]
5 x 30 MU / 1 ml (0,3 mg/1 ml) R/a ! € 231,81 €
sol. inj./perf. à diluer i.v./s.c. [ser. préremplie]
5 x 30 MU / 0,5 ml (0,3 mg/0,5 ml)
R/a ! € 231,13 €
5 x 48 MU / 0,5 ml (0,48 mg/0,5 ml)
R/a ! € 322,16 €

TEVAGRASTIM (Teva)
filgrastim [biosynthétique]
sol. inj./perf. à diluer i.v./s.c. [ser. préremplie]
5 x 30 MU / 0,5 ml (0,3 mg/0,5 ml)
R/a ! € 231,14 €
5 x 48 MU / 0,8 ml (0,48 mg/0,8 ml)
R/a ! € 321,72 €

Lénograstime

GRANOCYTE (DHL Pharma Logistics)
lénograstime [biosynthétique]
sol. inj./perf. (pdr + solv.) i.v./s.c. [flac. + ser. préremplie]
5 x 33,6 MUI (0,263 mg) + 1 ml solv. R/a ! € 382,24 €

Lipegfilgrastim

LONQUEX (Teva)
(lipeg)filgrastim [biosynthétique]
sol. inj. s.c. [flac.]
6 x 6 mg / 0,6 ml U.H. [3.931 €]
sol. inj. s.c. [ser. préremplie]
1 x 6 mg / 0,6 ml U.H. [655 €]

LONQUEX (Abacus)
(lipeg)filgrastim [biosynthétique]
sol. inj. s.c. [ser. préremplie]
1 x 6 mg / 0,6 ml U.H. [655 €]
(distribution parallèle)

LONQUEX (Orifarm Belgium)
(lipeg)filgrastim [biosynthétique]
sol. inj. s.c. [ser. préremplie]
1 x 6 mg / 0,6 ml U.H. [655 €]
(distribution parallèle)

Pegfilgrastim

NEULASTA (Amgen)
(peg)filgrastim [biosynthétique]
sol. inj. s.c. [ser. préremplie]
1 x 6 mg / 0,6 ml U.H. [532 €]

PELMEG (Mundipharma)
(peg)filgrastim [biosynthétique]
sol. inj. s.c. [ser. préremplie]
1 x 6 mg / 0,6 ml U.H. [532 €]


PELMEG (Orifarm Belgium)
(peg)filgrastim [biosynthétique]
sol. inj. s.c. [ser. préremplie]
1 x 6 mg / 0,6 ml U.H. [494 €]
(distribution parallèle)

PELGRAZ (Accord)
(peg)filgrastim [biosynthétique]
sol. inj. s.c. [ser. préremplie]
1 x 6 mg / 0,6 ml U.H. [532 €]
sol. inj. s.c. [stylo prérempli]
1 x 6 mg / 0,6 ml U.H. [532 €]

PELMEG (Abacus)
(peg)filgrastim [biosynthétique]
sol. inj. s.c. [ser. préremplie]
1 x 6 mg / 0,6 ml U.H. [532 €]
(distribution parallèle)

ZIEXTENZO (Sandoz)
(peg)filgrastim [biosynthétique]
sol. inj. s.c. [ser. préremplie]
1 x 6 mg / 0,6 ml U.H. [532 €]

Plérixafort

MOZOBIL (Sanofi Belgium) 
plérixafort
sol. inj. s.c. [flac.]
1 x 24 mg / 1,2 ml U.H. [4.806 €]
(médicament orphelin)

2.3.4. Hydroxycarbamide

Positionnement

- L'hydroxycarbamide est à réserver aux formes graves de drépanocytose (voir *Folia de juillet 2017*).



- L'hydroxycarbamide est aussi utilisé comme antitumoral (voir 13.1.2.4).

Indications (synthèse du RCP)

- Prévention des crises vaso-occlusives douloureuses dans la drépanocytose (à partir de l'âge de 2 ans).

Contre-indications


- Immunosuppression.
- Grossesse et allaitement.
- Insuffisance rénale sévère, insuffisance hépatique sévère (RCP).

Effets indésirables

- Troubles hématologiques.
- Troubles gastro-intestinaux.
- Dyspnée, rarement pneumopathie interstitielle.
- Ulcères et autres troubles cutanéomuqueux.
- Un risque d'affection maligne secondaire ne peut être exclu.


Grossesse et allaitement

- Il est recommandé d'arrêter l'hydroxycarbamide 3 à 6 mois avant une grossesse.
- L'allaitement est une contre-indication.

SIKLOS (Theravia) 

hydroxycarbamide

compr. pellic.

60 x 100 mg R/ a  87,66 €